

ARBORETUM

DE

L'ÉCOLE NATIONALE D'AGRICULTURE

DE GRIGNON

CATALOGUE DES ARBRES

QUI Y SONT CULTIVÉS

PAR

P. MOUILLEFERT

Professeur de Sylviculture à ladite École.



PARIS — 1889

INAP-PG BIBLIOTHEQUE GRIGNON



3 3004 00042901 2

ARBORETUM

DE L'ÉCOLE NATIONALE D'AGRICULTURE

DE GRIGNON



SYLVICULTURE

G 2007/73-3

PRÉFACE



De tout temps, parmi les botanistes, il s'est trouvé des amateurs de collections d'arbres et les *arboretum* célèbres sont nombreux. En France, c'est à Duhamel du Monceau que revient le premier l'honneur d'avoir réuni dans un but scientifique, sur ses propriétés de Vigny et du Monceau, les premières collections dendrologiques, d'après lesquelles il publia, en 1755, son fameux « *Traité des arbres et arbrisseaux qui se cultivent en France* ». Plus tard, les pépinières et le parc de Trianon, où Bernard de Jussieu établit la classification naturelle, devinrent aussi une très importante collection dendrologique; elle est encore aujourd'hui, malgré divers changements et le grand hiver de 1879, fort intéressante.

Vers 1810, de Vilmorin fit aussi d'importantes plantations d'arbres exotiques sur son domaine des Barres, que l'on peut encore admirer aujourd'hui.

Plus tard, les pépinières d'André Leroy, à Angers, de Simon Louis, à Metz, et des frères Audibert, à

Tarascon, devinrent aussi des établissements renommés pour leurs importantes collections d'arbres de toutes sortes.

Parmi les *arboretum* actuels et de création récente, citons celui de Segrez, près Arpajon, établi par le regretté M. Alph. Lavallée, de 1858 à 1884 : c'est certainement l'un des plus riches et des plus remarquables qu'il y ait au monde. Signalons aussi les magnifiques collections de la villa Thuret, à Antibes, réunies par M. G. Thuret, de 1856 à 1875, et spécialement formées d'arbres et d'abrisseaux exotiques des pays chauds. Ce riche *arboretum* est maintenant confié aux bons soins de M. Ch. Naudin, qui ne le laissera pas périr.

A l'étranger, il existe également de nombreuses et belles collections dendrologiques; citons notamment celles de Kew, près de Londres, bien connues.

La culture et la connaissance des arbres intéressent en effet, à des titres divers, beaucoup de monde, particulièrement le cultivateur, l'amateur de jardins, l'architecte paysagiste, le grand propriétaire, le forestier, l'ingénieur, le botaniste, le pépiniériste et même les municipalités.

L'*arboretum* de l'école nationale de Grignon, que j'ai commencé en 1873, a été surtout créé dans le but d'offrir aux jeunes gens de ce grand établissement scientifique les moyens d'étude en vue de la connaissance des principaux arbres indigènes et exotiques, et présentant un certain intérêt cultural ou scientifique.

Cet *arboretum* comprend aujourd'hui plus de 2,000 espèces ou variétés de pleine terre sous le climat de Paris, et leur nombre s'augmente chaque année; elles sont classées par familles et genres disposés en séries linéaires, méthode très commode pour l'étude.

Une telle collection est d'autant plus utile qu'il n'y a en ce moment aucun ouvrage d'ensemble, pas plus en France qu'à l'étranger, traitant cette importante question des arbres actuellement cultivés en Europe.

Grâce aux nombreux matériaux que j'ai pu réunir depuis une quinzaine d'années et à l'étude spéciale que j'ai faite du sujet, peut-être essaierai-je un jour, malgré l'extrême difficulté de l'œuvre, de contribuer à combler cette lacune. En attendant, j'ai pensé que la publication du Catalogue de l'*arboretum* de l'école de Grignon pourrait être de quelque utilité à ceux que la culture des arbres et arbrisseaux intéresse à un titre quelconque.

P. MOUILLEFERT.

Paris, le 5 mai 1889.

ÉNUMÉRATION

DES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

Classe I. — DICOTYLÉDONÉES

I. RANUNCULACEÆ. — RENONCULACÉES

1^{er} CLÉMATIS L. — CLÉMATITE

- C. vitalba** L. — **C.** des Haies. (*Herbe aux gueux*). Europe.
C. flammula L. — **C.** flammule. **C.** odorante. Europe.
C. orientalis L. **C. flava** Mœnch. — **C.** d'Orient. Caucase.
C. glauca Willd. — **C.** à feuilles glauques. Sibérie.
C. montana Hamilt. — **C.** des Montagnes. Népal.
C. viorna L. — **C.** Viorne. Amér. sept.
C. cylindrica Sims. — **C.** cylindrique. Amér. sept.
C. Hendersoni Hort. — **C.** d'Henderson. Hort.
C. campaniflora Brot. — **C.** clochettes. Espagne.
C. viticella L. — **C.** viticelle. Europe mérid.
var. — **flore pleno.** — **C. V.** à fleurs doubles.
— — **venosa.** — **C. V.** veinée.
— — **rubra grandiflora.** — **C. V.** à grandes fleurs.
C. patens Decne. — **C.** étalée. Japon.
var. — **cœrulea** Lindl. — **C. E.** bleue.
— — **Sophia** Sieb. — **C. E.** Sophie.
— — **alba.** — **C. E.** blanche.
— — **Jackmanni.** — **C. E.** de Jackman.
— — **azurea grandiflora.** — **C. E.** azurée.
C. florida Thbg. — **C.** à grandes fleurs. Japon.
var. — **bicolor.** — **C.** à G. F. bicolore.
C. lanuginosa Lindl. — **C.** laineuse. Chine et Japon.
C. cirrhosa L. — **C.** de Cirrha. Europe australe.
C. calycina Ait. — **C.** à grand calice. Iles Baléares.

- C. Aethusifolia** Turcz. — **C.** à feuilles d'Ethusa. *Orient ?*
C. Alpina Will., *Atragene alpina* L. — **C.** des Alpes. *Europe.*

2° XANTHORHIZA L'Hérit. — XANTHORHIZE

- X. apiifolia** L'Hérit. — **X.** à feuilles d'Ache. *Amér. sept.*

3° PÆONIA L. — PIVOINE

- P. Moutan** L. *P. Arborea*. Hort. — **P.** en arbre. *Chine.*
var. — **papaveracea** Lodd. — **P.** en **A.** à fleurs de Pavot.
 — — **maxima plena.** — **P.** en **A.** à grandes fleurs doubles.
 — — **alba belgica.** — **P.** en **A.** blanche de Belgique.
Variétés horticoles diverses.

II. MAGNOLIACEÆ DC. — MAGNOLIACÉES

4° MAGNOLIA L. — MAGNOLIA

- M. grandiflora** Michx fils. — **M.** à grandes fleurs.
États-Unis.
M. — **gallisoniensis.** — **M.** à G. F. de Gallisson.
M. campbellii Hook. — **M.** de Campbell. *Sikhim.*
M. umbrella Lmk *M. tripetala* Michx fils. — **M.** parasol.
Amér. sept.
M. macrophylla Michx fils. — **M.** à grandes feuilles.
Amér. sept.
M. acuminata Michx fils. — **M.** acuminé. *Amér. sept.*
M. glauca L. — **M.** glauque. *Amér. sept.*
M. auriculata Lamk. — **M.** auriculé. *États-Unis.*
M. cordata Michx fils. — **M.** à feuilles en cœur. *Amér. sept.*
M. conspicua Salisb. *M. Yulan* Desf. — **M.** Yulan. *Chine.*
var. — **soulangeana.** — **M.** Y. de Soulange.
M. gracilis Salisb. *M. Kobus* DC. — **M.** grêle. *Japon.*
M. obovata Thbg. — **M.** obové. *Japon.*
var. — **Lennéi.** — **M.** O. de Lennée.
M. fuscata Andr. *Liriopsis fuscata* Spach. — **M.** à fleurs
 brunes. *Chine.*

5° **DRIMYS** Forst. — **DRIMYDE**

D. Winterii Forst. — **D.** de Winter. *Nouvelle-Grenade.*

6° **LIRIODENDRON** L. — **TULIPIER**

L. tulipifera L. — **T.** de Virginie. *Amér. sept.*

var. — **variegata.** — **T.** de V. à feuilles panachées.

7° **ILLICIUM** L. — **BADIANE**

I. anisatum L. — **B.** anisée (*anis étoilé*). *Chine et Japon.*

I. floridanum L. — **B.** d. l. Floride. **B.** rouge. *Amér. sept.*

I. parviflorum Michx. — **B.** à petites fleurs. *Floride.*

I. religiosum Sieb et Zucc. — **B.** sacrée. *Japon.*

III. **ANONACEÆ.** — **ANONACÉES**8° **ASIMINA** Adans.

A. triloba Adans. — **A.** à trois lobes. *Pensylvanie et Floride.*

IV. **BERBERIDEÆ.** — **BERBÉRIDÉES**9° **NANDINA** Thbg. — **NANDINA**

N. domestica Thbg. — **N.** domestique. *Japon.*

10° **BERBERIS** L. — **ÉPINE-VINETTE**

B. vulgaris L. — **E.** commune. *Europe, Asie, Amérique.*

var. — **foliis purpureis** — **E. C.** à feuilles pourpres.

— — **fructu albo** — **E. C.** à fruit blanc.

— — — **violaceo** — **E. C.** à fruit violet.

B. sinensis Desf. — **E.** de la Chine. *Chine.*

B. cretica L. *B. cratægina* DC. — **E.** de Crète. *Europe australe.*

B. sibirica Pall. — **E.** de Sibérie. *Altaï.*

B. coriacea Hort. — **E.** coriace. *Asie?*

- B. canadensis** Mill. — E. du Canada. *Amér. sept.*
B. aristata DC. — E. aristée. *Népaul.*
B. nepalensis Hort. — E. du Népaul. *Asie centrale.*
B. Wallichiana DC. — E. de Wallich. *Népaul.*
B. Neuberti Hort. — E. de Neubert. *Orig. hybride.*
B. macrophylla Hort. — E. à grandes feuilles. *Hort.*
B. Guimpelii C. Koch. — E. de Guimpel. *Chine.*
B. ilicifolia Forst. — E. à feuilles de Houx. *Patagonie.*
B. spathulata Schrad. — E. à spathe. *Chine.*
B. actinacantha. Hort. *B. concinna* Hook. — E. de Knight. *Magellan.*
B. Hookerii Hort. *brit.* — E. de Hooker. *Orig. hybride ?*
B. Darwinii Hook. — E. de Darwin. *Chili.*
B. microphylla Forst. *B. Dulcis* Sweet. — E. à petites feuilles. *Chili.*
B. empetrifolia Lmk. — E. à feuilles d'Empetrum. *Chili.*
B. stenophylla. Hort. *brit.* — E. à feuilles étroites. *Orig. hybr.*

11° **BERBERIDOPSIS** Hook *fls.*

- B. corallina** Hook *fls.* — B. à corail. *Chili.*

12° **MAHONIA** DC.

- M. fortunei** Lindl. — M. de fortune. *Chine.*
M. aquifolium Nutt. — M. à feuilles de Houx. *Amér. sept.*
var. — **foliis rubris.** — M. à F. de H. rouge.
 — — **intermedia.** — M. à F. de H. intermédiaire.
 — — **fascicularis.** — M. à F. de H. fasciculé.
 — — **repens.** — M. F. de H. rampant.
M. Japonica DC. — M. du Japon. *Japon.*
var. — **Beali** M. Siebold. — M. du J. de Beal.
M. trifurca Forst. — M. à trois pointes. *Chine sept.*
M. trifoliata Hartw. — M. à trois folioles. *Chine.*

V. **LARDIZABALEÆ.** — **LARDIZABALÉES**

13° **AKEBIA** Decne

- A. quinata** Decne. — A. à cinq feuilles. *Japon.*

14° **HOLLBÆLLIA** Wall.

H. latifolia Wall *Stauntonia latifolia* Hort. — **H.** à larges feuilles. *Népaul*.

15° **STAUNTONIA** DC.

S. chinensis DC. — **S.** de la Chine. *Chine*.

16° **LARDIZABALA** Ruiz et Pav.

L. biternata Ruiz et Pav. — **L.** biterné. *Chili*.

VI. MENISPERMACEÆ. — MÉNISPERMACÉES

17° **COCCULUS** C. Bauh.

C. carolinus DC. — **C.** de la Caroline. *Amér. sept.*

18° **MENISPERMUM** Tourn. — **MENISPERME**

M. canadense L. — **M.** du Canada. *Amér. boréale*.

var. — **virginica**. — **M.** du **C.** de Virginie. *Virginie*.

M. dahuricum DC. — **M.** de la Dahourie. *Sibérie*.

VII. SCHIZANDRACEÆ. — SCHIZANDRACÉES

19° **SCHIZANDRA** Michx.

S. chinensis Hook et Benth. — **S.** de Chine. *Région de l'Amour*.

20° **KADSURA** Juss.

K. japonica Kæmpf. — **K.** du Japon. *Japon*.

VIII. DILLENACEÆ. — DILLÉNIACÉES

21° **ACTINIDIA** Lindl.

A. volubilis Lavallée, *Trochostigma volubilis* Sieb. — **A.** volubile. *Japon*.

A. Kolomikta Rupr. — **A.** de la Mandchourie. *Région de l'Amour.*

IX. CALYCANTHACEÆ. — CALYCANTHACÉES

22° CALYCANTHUS L. — CALYCANTHE

C. floridus L. — **C. d. l.** Floride, Pompadour, arbre aux anémones. *Amér. sept.*

var. — **inodorus.** — **C. d. l. F.** Inodore.

— — **lævigatus.** — **C. d. l. F.** Lisse.

— — **glaucus.** — **C. d. l. F.** Glauque.

C. occidentalis Hook *C. macrophyllus* Hort. — **C.** à grandes feuilles. *Amér. sept.*

23° CHIMONANTHUS Lindl.

C. fragrans Lindl. *Calycanthus præcox* L. — **C.** odorant. *Amér. sept.*

var. — **grandiflora** Lindl. — **C. O.** A grandes fleurs.

X. BIXACEÆ. — BIXACÉES

24° AZARA Ruiz et Pav.

A. microphylla Ruiz et Pav. — **A.** à petites feuilles. *Chili.*

A. crassifolia Ruiz et Pav. — **A.** à feuilles épaisses. *Chili.*

25° IDESIA Maxim.

I. polycarpa Maxim. — **I.** polycarpe. *Japon.*

XI. ZANTHOXYLEÆ. — ZANTHOXYLÉES

26° ZANTHOXYLUM L'Hérit. — CLAVALIER

H. fraxinifolium Willd. — **C.** à feuilles de Frêne. *Amér. sept.*

- H. planispinum** Sieb et Zucc. — **C.** à épines plates. Japon.
H. piperitum DC. *Fagara piperita* Thbg. — **C.** à feuilles de Poirier. Japon.

27° **PTELEA** L. — **PTELÉE**

- P. trifoliata** L. — **P.** à trois feuilles (*Orme de Samarie*). Région de l'Amour.
 var. — **heterophylla**. — **P.** à tr. **F.** hétérophylle.
 — — **foliis variegatis**. — **P.** à tr. **F.** à feuilles panachées.

28° **PHELLODENDRON** Rupr.

- P. amurense** Rupr. — **P.** du fleuve Amour. *Asie sept.*
P. japonicum Maxim. — **P.** du Japon. Japon.

29° **CNEORUM** Lin. — **CAMELÉE**

- C. tricoccum** L. — **C.** à trois coques. *Europe mérid.*

30° **AILANTUS** Desf. — **AILANTE**

- A. glandulosa** Desf. — **A** glanduleux (vulg. *Vernis du Japon*).

XII. AURANTIACEÆ. — AURANTIACÉES

31° **CITRUS** L. — **CITRONNIER, ORANGER**

- C. aurantium** Risso. — **C.** Oranger. **O.** à fruit doux. **O.** commun. *Chine méridionale.*
C. deliciosa Ten. — **C.** délicieux. **O.** Mandarinier. *Chine.*
C. bigaradia Lois. — **C.** Bigaradier. *Indes et Chine.*
C. japonica Thbg. — **C.** du Japon. *Chine et Japon.*
C. limetta bergamia Risso. — **C.** Limettier bergamottier. *Chine.*
C. decumana Risso et Poit. — **C.** Pompoleon, pompelmouse. *Chine méridionale.*
C. Limonium Risso et Poit. — **C.** commun (*Limonier*). *Chine mér.*
C. medica Lin. — Cédra-tier commun. *Chine.*
C. triptera Desf. *C. trifolia* L. *Ægle sepiaria* DC. — **C.** à trois feuilles. Japon.

XIII. MELIACEÆ. — MÉLIACÉES

32° CEDRELA *Lin.*

C. sinensis *A. Juss.* *Ailantus flavescens* *Carr.* — **C.** de la Chine. *Chine.*

33° MELIA *Lin.*

M. azedarach *Lin.* — Lilas des Indes, arbre à chapelets. Margousier. *Asie.*

XIV. CORIARIEÆ. — CORIARIÉES

34° CORIARIA *L.* — CORROYÈRE

C. myrtifolia *Lin.* — **C.** à feuilles de Myrte (*Redoul*). *Région médit.*

XV. MYRTACEÆ. — MYRTACÉES

35° MYRTUS *L.* — MYRTE

M. communis *L.* — **M.** commun. *Région médit.*

36° PUNICA *Tourn.* — GRENADIER

P. granatum *L.* — **G.** commun. *Région médit.*

var. flava. — **G. C.** à fleurs jaunes.

— **rubra flore pleno.** — **G. C.** à fleurs rouges doubles.

— **flore variegata Legrelli.** — **G. C.** à fleurs panachées.

— **nana.** — **G. C.** nain. *Amér. mérid.*

37° EUCALYPTUS *Labill.*

E. globulus *Labill.* — **E.** globuleux. *Australie.*

E. amygdalina *Labill.* — **E.** à feuilles d'Amandier.

E. Melliodora *Cunningh.* — **E.** à bois jaune. *Now.-Australie.*

E. Coriacea *Hort.* — **E.** à feuilles coriaces. *Australie.*

- E. rostrata** *Schlecht.* — E. à rostre. *Australie du Sud.*
E. populifolia *Hook.* — E. à feuilles de Peuplier. *Australie.*
E. resinifera *Smith.* — E. à résine. *Nouvelle-Galles du Sud.*

XVI. ROSACEÆ. — ROSACÉES

TRIBU I. — DRYADEÆ. - DRYADÉES

38° **POTENTILLA** *L.* — **POTENTILLE**

- P. fruticosa** *L.* — P. frutescente. *Europe sept.*
var. dahurica vel. **P. floribunda** *Pursh.* — P. de daourie. *Sibérie.*

39° **RUBUS** *L.* — **RONCE**

- R. fruticosus** *L.* — R. frutescente. *Europe.*
var. inermis *L.* — R. F. sans épines.
 — *laciniata.* — R. F. à feuilles laciniées.
 — *flore pleno.* — R. F. à fleurs doubles.
R. cæsius *L.* — R. bleuâtre. *Europe.*
R. saxatilis *L.* — R. des rochers. *Europe.*
R. tomentosus *Willd.* — R. tomenteuse. *Europe.*
R. phænicolasius *Maxim.* — R. à tige rouge. *Japon.*
R. nutkanus *Moç.* — R. de Noutka. *Amér. sept.*
R. leucodermis *Dougl.* — R. à écorce blanche. *Orégon.*
R. Idæus *L.* — R. Framboisier. *Europe.*
R. occidentalis *L.* — R. Framboisier du Canada. *Amér. sept.*
R. deliciosus *Torr.* — R. délicieuse. *Canada.*
R. odoratus *L.* — R. odorante. *Amér. sept.*
R. spectabilis *Pursch.* — R. élégante. *Amér. sept.*
R. rosæflorus *Hook.* — R. à fleurs de Rose. *Pérou.*

TRIBU II. — SPIRACEÆ. - SPIRÉES

40° **SPIREA** *Lin.* — **SPIRÉE**

FLEURS EN CYME CORYMBIFORME

- S. opulifolia** *L.* — S. à feuilles d'Obier. *Amér. sept.*
S. Fortunei *Planch.* — S. de Fortune. *Chine.*
var. — macrophylla. — S. de F. à grandes feuilles.
 — — *corymbiflora.* — S. de F. à fleurs coccinées.

- S. Fortunei atrosanguinea.** — **S.** de **F.** sanguin foncé.
S. callosa Thbg. — **S.** calleuse. Japon.
S. expansa Wall. — **S.** de Kamaon. *Indes orientales.*
S. bella Sims. — **S.** élégante. *Népaul.*

FLEURS EN CORYMBES

- S. ulmifolia** Scop. — **S.** à feuilles d'Orme. *Sibérie.*
S. chamædrifolia L. — **S.** à feuilles de petit chêne. *Sibérie.*
S. cana Walldst. — **S.** blanchâtre. *Croatie.*
S. flexuosa Fisch. — **S.** flexueuse. *Sibérie.*
S. trilobata L. *S. thalictroides* Hort. — **S.** à trois lobes. *Altaï.*
S. cratægifolia Lmk (*S. corymbosa* Rafn). — **S.** à feuilles d'Aubépine. *Sibérie.*
S. lanceolata Poir (*S. Reevesiana* Lindl). **S. cantoniensis** Lour.
S. à feuilles lancéolées. *Chine.*
var. — **flore pleno.** — **S.** à **F. L.** à fleurs doubles.
— — **van Houttei.** — **S.** à **F. L.** de van Houtte.
S. hypericifolia L. — **S.** à feuilles de Millepertuis. *Europe.*
var. **brevifolia.** — **S.** à **F. d. M.** à feuilles courtes.
— **vaccinifolia.** — **S.** à **F. d. M.** à feuilles d'Airelle.
S. canescens Don. — **S.** grisâtre. *Népaul.*
S. Thunbergii Sieb et Zucc. — **S.** de Thunberg. *Japon.*
S. prunifolia Sieb et Zucc. — **S.** à feuilles de Prunier. *Japon.*
S. Blumei G. Don. — **S.** de Blume. *Japon.*
var. **rupestris** (*Rupestris* Sieb). — **S.** de **B.** des rocailles.

FLEURS EN PANICULES

- S. lævigata** L. — **S.** lisse. **S.** à feuilles glauques. *Sibérie et Amér. sept.*
S. salicifolia L. — **S.** à feuilles de Saule. *Sibérie.*
var. **carpinifolia**, *S. amæna* Raf. — **S.** à **F.** de **S.** à feuilles de Charme.
— **major**, *S. obovata* Raf. — **S.** à **F.** de **S.** à grandes feuilles.
— **paniculata alba.** — **S.** à **F.** de **S.** paniculée.
— **Regeliana** Don. — **S.** à **F.** de **S.** de Regel.
— **grandiflora rosea.** — **S.** à **F.** de **S.** à grandes fleurs roses.
— **carnea**, *S. nepalensis carnea* Hort. — **S.** à **F.** de **S.** carnée.
— **Fontenaysii rosea.** — **S.** à **F.** de **S.** de Fontenay.

- S. Douglasii** Hook, *S. argentea* Hort. — **S.** de Douglas. *Orégon.*
S. tomentosa L. — **S.** tomenteuse. *Amér. sept.*
Spiræa nobleana Hook. — Spirée noble. *Californie.*
S. ariæfolia Smith. — **S.** à feuilles d'Aria. *Amér. boréale.*
var. flore pleno. — **S.** à **F. A.** à fleurs doubles.
S. sorbifolia L. — **S.** à feuilles de Sorbier. *Sibérie.*
S. Lindleyana Wall. — **S.** de Lindley. *Népaul.*

41° EXOCHORDA Lindl.

- E. grandiflora** Lindl. *Spiræa grandiflora* Hook. — **E.** à grandes fleurs. *Chine boréale.*

42° NUTTALIA Torr et Gr.

- N. cerasiformis** Torr et Gr. — **N.** cérasiforme. *Amér. sept.*

43° KERRIA DC.

- K. Japonica** DC. *Corchorus japonicus* Thbg. — **K.** du Japon.
var. flore pleno. — **K.** du **J.** à fleurs doubles.
 — *foliis variegatis.* — **K.** du **J.** à feuilles panachées.
 — *ramulis aureis.* — **K.** du **J.** à rameaux dorés.

44° RHODOTYPUS Sieb et Zucc.

- R. kerrioides** Sieb et Zucc. — **R.** faux Kerria. *Japon.*

TRIBU III. — AMYGDALÆ.- AMYGDALÉES

45° AMYGDALUS Tourn. — AMANDIER

- A. communis** Lmk. — **A.** commun. *Région méditerranéenne.*
var. fragilis. — **A. C.** à coque tendre.
 — *ossea.* — **A. C.** à coque dure.
 — *macrocarpa.* — **A. C.** à gros fruits.
 — *flore pleno.* — **A. C.** à fleurs doubles.
 — *persicoïdes*, *Persica amygdalus* Dalech. — **A. C.** faux Pêcher. *Origine hybride.*
 — *amara.* — **A. C.** à fruit amer.
A. prunifolia Decne. — **A.** à feuilles de Prunier. *Origine?*

- A. orientalis** Ait. *argentea* Lmk. — **A. argenté.** *Orient.*
A. nana L. *A. Georgica* Desf. — **A. campestris** Besser. **A. nain.**
Russie et Asie mineure.
var. flore albo. — **A. N.** à fleurs blanches.
 — — **rubro.** — **A. N.** à fleurs rouges.
 — — **pleno.** — **A. N.** à fleurs doubles.
Amgdalus incana Pall. — Amandier blanchâtre. *Cau-*
case.

46° **PERSICA** Tourn. — **PÊCHER**

- Persica vulgaris** Mill. — Pêcher commun. *Chine.*
var. flore pleno roseo. — **P. C.** à fleurs doubles roses.
 — — — **albo.** — **P. C.** à fleurs doubles blanches.
 — **fastigiata.** — **P. C.** pyramidal.
 — **fructu carneo adhaerente.** — **P. C.** à chair adhé-
 rente.
 — **fructu carneo non adhaerente.** — **P. C.** à chair
 non adhérente.
 — **ispahanensis** Lois. — **P. C.** d'Ispahan. *Perse.*
 — **compressa.** — **P. C.** à fruit aplati.
 — **laevis.** — **P. C.** à fruit lisse (*Brugnon*).
 — **sinensis.** — **P. C.** de la Chine.
 — — **flore pleno rubro.** — **P. C.** de la **C.** à
 fleurs doubles roses.
 — — **flore pleno albo.** — **P. C.** de la **C.** à
 fleurs doubles blanches.
P. Davidiana Carr. — **P.** de David. *Chine.*
var. alba. — **P. d. D.** à fleurs blanches.

47° **ARMENIACA** Tourn. — **ABRICOTIER**

- A. vulgaris** Lmk. — **A.** commun. *Asie mineure.*
var. amygdalifolia. — **A. C.** à feuilles d'Amandier.
 — **caucasica.** — **A. C.** du Caucase.
 — **salicifolia.** — **A. C.** à feuilles de Saule.
A. sylvestris Sargent. — **A.** sauvage. *Chine.*
A. dasycarpa Pers. — **A.** noir. **A.** du pape. *Chine.*

48° **PRUNUS** Tourn. — **PRUNIER**

- P. Brigantiaea** Vill. — **P.** de Briançon. *Alpes.*

- P. triloba** Lindl. (*Amygdalopsis Lindleyi* Carr.). — P. à trois lobes. Chine.
- P. tomentosa** Thbg. — P. tomenteux. Japon.
- P. sinensis** Pers, *P. Japonica* Thbg. — P. de Chine. Chine et Japon.
- P. Mume** Sieb et Zucc. — P. Mume. Japon.
- P. domestica** L. — P. domestique. Europe australe.
 var. **flore pleno**. — P. D. à fleurs doubles.
 — **armenioides**. — P. D. faux Abricotier.
 — **claudiana**. — P. D. reine Claude.
 — **damascena**. — P. D. de Damas.
 — **turonensis**. — P. D. de Tours.
 — **prunecautiana**. — P. D. à pruneaux.
 — **quetschiana**. — P. D. quetsche.
- P. insititia** L. — P. sauvage. Europe.
- P. spinosa** L. — P. épineux, *Prunellier*, *Epine noire*. Europe.
 var. **flore pleno**. — P. E. à fleurs doubles.
 — **fruticans**. — P. E. arbrisseau. Europe.
- P. myrobolana** Lois. *P. Cerasifera* Ehrh. — P. myrobolan. Orient.
- P. Cocomilio** Ten. — P. cocomilio. Italie.
- P. Pissardi** Carr. — P. Pissard. Perse.
- P. divaricata** Ledeb. — P. divariqué. Caucase.
- P. Mirabella** (Anon.?) — P. Mirabelle. Origine?
- P. ursina** Kotschy. — P. des ours. Orient.
- P. americana** Marsh *P. nigra* Ait. P. d'Amérique. Amér. sept.
 var. **hiemalis** Michx. *P. mollis* Ten. — P. d'A. hivernal. Amér. sept.
- P. chicasa** Michx (*P. angustifolia* Marsh). — P. chicassa. Amér. sept.
- P. pygmæa** Willd. *P. maritima* Wang. *P. sphaerocarpa* Michx. *P. acuminata* Michx. — P. pygmée. Amér. sept.
- P. pumila** L. *P. depressa* Pursh. — P. nain. Amér. sept.
- P. prostata** Labill. *Amygdalus incana* Pall. — P. blanchâtre. Caucase.

SOUS-GENRE

49° CERISIER

- Cerasus Avium** *Manch.* — **C.** Merisier. *Europe et Asie.*
var. **flore pleno.** — **C. M.** à fleurs doubles.
 — **Juliana.** — **C. M.** Guignier.
 — — **fructu nigro præcox.** — **C. M.** Guignier
 noir précoce.
 — **Duracina.** — **C. M.** Bigarreaulier à gros fruits blancs.
 — — **fructu nigro.** — **C. M. B.** à fruits
 noirs.
 — — **cordata.** — **C. M. B.** à fruits en cœur.
 — — **frutu rubro.** — **C. M. B.** à fruits rouges.
- C. acida** *Mill.*, *C. Caproniana* *DC.* — **C.** acide (*Griottier*).
Europe.
var. **flore pleno.** — **C. A.** à fleurs doubles.
 — **pumila.** — **C. A.** nain.
 — **salicifolia.** — **C. A.** à feuilles de Saule.
 — **polygyna.** — **C.** Griottier à bouquets.
 — **De Montmorency.** — **C.** à longue queue.
 — **à gros fruits.** — Gobet à courte queue.
 — **anglaise hâtive.** — Fruit arrondi rouge.
 — **tardive.** — Fruit ovale clair jaune.
- C. chamæcerasus** *Lois.* — **C.** nain. *Europe.*
C. persicifolia *Lois.* *C. borealis* *Michx P.* *pensylvania* *Lin.* —
C. à feuilles de Pêcher. *Amér. sept.*
C. Mahaleb *Mill.* — **C.** Mahaleb. **C.** de Ste-Lucie. *Europe.*
C. Fontanesiana *Sp. P.* *Græca* *Desf.* — **C.** de la Grèce.
C. semperflorens *DC.* — **C.** toujours fleuri. **C.** de la
Toussaint. Europe.
C. serrulata *Lindl.* — **C.** à feuilles serrulées. *Chine.*
C. paniculata *Ker.* *Pseudo cerasus* *Lindl.* — **C.** *Sieboldi* *Carr.*
C. paniculé. *Chine.*
C. padus *DC.* *P. padus* *L.* — **C.** à grappes. **C.** puant. *Europe.*
var. **latifolia.** — **C. P.** à larges feuilles.
 — **cornuta** *Wall.* — **C. P.** à cornes. *Himalaya.*
C. Virginiana *L.* (*Prunus*). — **C.** de Virginie. *Amér. sept.*
C. serotina *Lois* (*Prunus*). — **C.** tardif. *Amér. sept.*

- C. Capuli** DC. (*Prunus*). — **C.** capuli. *Amér. sept.*
C. lusitanica Lois. — **C.** Laurier-cerise du Portugal.
var. **Azorica**. — **C.** du P. des Açores.
C. Laurocerasus Lois. — **C.** Laurier-cerise. *Europe.*
var. **latifolia**. — **C. L.** à larges feuilles.
 — **microphylla**. — **C. L.** du Caucase.
 — **longifolia**. — **C. L.** à longues feuilles.
C. Caroliniana Michx. — **C.** de la Caroline. *Amér. sept.*
C. ilicifolia Nutt. — **C.** à feuilles de Houx. *Californie.*

TRIBU IV. — POMACEÆ. - POMACÉES

I. Arbres et arbustes dont les fruits sont à noyaux.

50° **COTONEASTER** (*Médik.*)

- C. reflexa** Leroy. — **C.** réfléchi. *Origine?*
C. vulgaris Lindl. — **C.** commun. *Europe.*
var. **melanocarpa** *C. melanocarpa* Fisch. — **C. C.** à fruits noirs. *Europe.*
C. tomentosa Lindl. — **C.** tomenteux. *Europe.*
C. laxiflora Jacq. — **C.** à fleurs lâches. *Sibérie.*
C. Fontanesii Spach. — **C.** de Desfontaines. *Asie occid.*
C. affinis Lindl. — **C.** de Lindley. *Népaul.*
C. frigida Lindl. — **C.** des montagnes. *Népaul.*
var. **himalayensis**. — **C. d. M.** de l'Himalaya.
C. Sikkimensis Mouill.? — **C.** du Sikkim? *Asie.*
C. nummularia Fisch. — **C.** à feuilles rondes. *Asie mineure.*
C. sinensis Hort. — **C.** de Chine. *Népaul.*
C. acuminata Lindl. — **C.** acuminé. *Népaul.*
C. microphylla Wall. — **C.** microphyllé. *Népaul.*
var. **buxifolia**. — **C. M.** à feuilles de Buis.
 — **rotundifolia**. — **C. M.** à feuilles rondes.
 — **thymifolia**. — **C. M.** à feuilles de Thym.
C. pyracantha Sp. *Pyracantha coccinea* Ræm. — Buisson ardent d'Europe. *Europe et Asie.*

- var. **lalandi**. — C. P. de Lalande.
 — **crenulata** Hort. — C. P. crénelé. Népaül.

50° **MESPILUS** Lindl. — **NÉFLIER**

- M. germanica** L. — N. commun. Europe.
 var. **macrocarpa**. — N. G. à gros fruits.
M. Smithii Seringe. *M. lobata* Bosc. — N. de Smith. Caucase.

SOUS-GENRE

51° **CRATÆGUS** Lindl. — **AUBÉPINE**

SECTION I. — FEUILLES dentées ou courtement LOBÉES

- C. hybrida** Mouil. *C. alnifolia* Hort. — A. hybride. Japon.
C. flava Willd (*Mespilus Vild*). — A. à fruits jaunes. Amér. sept.
C. latifolia Pers. — A. à larges feuilles. Amér. sept.
C. Lavalleyi F. Herineq. *C. Carrieri* (Rev. hort.). — A. de Lavalleye. Amér. sept.?
C. mexicana Moç. — A. du Mexique. Mexico.
C. elliptica Ait. *C. Fontanesiana* Spach. — A. à feuilles elliptiques. Amér. sept.
C. pirifolia Ait. — A. P. à feuilles de Poirier. Amér. sept.
C. punctata Jacq. — A. P. à fruits ponctués. Amér. sept.
 var. **fructibus rubris**. — A. à fruits rouges.
 — **fructibus aureis**. — A. à fruits dorés.
 — **Segreziana**. Lavall. — A. P. Segrez (à gros fruits rouges). Origine?
C. Crus-galli Lin. — A. ergot-de-coq. Amér. sept.
 var. **prunifolia**. — A. E. d. G. à feuilles de Prunier.
 — **lucida splendens**. — A. E. d. G. à feuilles luisantes.
C. linearis Persoon. *C. salicifolia* Medik. — A. à feuilles linéaires. Amér. sept.
C. glandulosa Mæench. — A. glanduleuse. Amér. sept.
C. succulenta (Hort.) — A. succulente. Amér. sept.?
C. sanguinea Pall. *C. purpurea* Poir. *C. chlorocarpa* Hort. — A. sanguine. Sibérie.
C. rivularis Nutt. — A. des rivages. Amér. sept.

- C. Douglasii** Lindl. — **A.** de Douglas. *Amér. sept.*
C. arborescens Elliot. — **A.** arborescente. *Amér. sept.*
C. coccinea L. — **A.** à fruit cocciné. *Amér. sept.*
 var. **mollis** C. *Wendlandi*. — **A. C.** à feuilles molles.
 — **viridis**. — **A. C.** à feuilles vertes.
 — **macrocarpa**. — **A. C.** à gros fruits.
C. Celsiana Bosc. — **A.** de Cels. *Origine?*
C. acerifolia Poir *C. cordata* Mill *C. corallina* Desf. — **A.** à
 feuilles d'Érable. *Amér. sept.*
C. nigra Wald. — **A.** à fruits noirs. *Hongrie.*

SECTION II. — FEUILLES PORTEMENT LOBÉES OU PINNATIFIDES

- C. pentagyna** Wald. *C. Korolkowi* Hort. — **A.** à cinq noyaux.
Orient.
C. spathulata Michx. — **A.** à feuilles spatulées. *Amér. sept.*
C. tanacetifolia Pers. — **A.** à feuilles de Tanaisie. *Orient.*
C. Leona Coul. — **A.** de Léon. *Orient?*
C. odoratissima Lindl. *C. orientalis* Pall. — **A.** odorante.
Crimée, Asie mineure.
C. Tournefortii DC. — **A.** de Tournefort. *Orient.*
C. ambigua Frøb. — **A.** ambiguë. *Orient?*
C. azarolus L. — **A.** Azerolier. Épine d'Espagne. *Eur. mér.*
C. fissa Hort. *C. Azarolus fissa*. — **A.** à feuilles fides. *Orient.*
C. aronia Bosc. — **A.** faux Azerolier. *Orient.*
C. oliveriana Bosc. *C. melanocarpa* Bied. — **A.** d'Olivier.
Orient.
C. heterophylla Flugg. — **A.** hétérophylle. *Orient.*
C. oxyacantha L. — **A.** épineuse. Épine blanche. *Europe.*
 var. **flore rubro**. — **A. E.** à fleurs rouges.
 — — — **pleno**. — **A. E.** à fleurs rouges doubles.
C. monogyna Jacq. — **A.** monogyne. *Europe.*
 var. **fastigiata**. — **A. M.** fastigié.
 — **pendula**. — **A. M.** pleureur.
 — **flore rubro**. — **A. M.** à fleurs rouges.
 — **flore pleno coccineo**. — **A. M.** à fleurs doubles
 coccinées.
C. pinnatifida Bge. — **A.** pinnatifide. *Chine boréale.*

II. — Fruits à pépins.

52* **SORBUS L. — ALISIERS ET SORBIERS**SECTION I. — *Alisiers*. FEUILLES SIMPLES

- S. Aria** Crantz *Aria nivea* Hoost. — Alisier blanc (Allouchier). *Europe*.
- var. **macrophylla**. — A. B. à grandes feuilles.
- **quercoides**. — A. B. à feuilles de Chêne.
- **græca**. — A. B. de Grèce. *Europe australe et Asie*.
- **obtusifolia** DC. — A. B. à feuilles obtuses. *Europe*.
- S. lanata** Decne *S. vestita* Lodd. — A. laineux. *Népal*.
- S. latifolia** Spach. — A. de Fontainebleau. *Europe*.
- S. Hostii** Host. — A. de Host. *Dauphiné*.
- S. scandica** Decne. — A. de Scandinavie. *Europe*.
- S. Chamæmespilus** Host. — A. nain. *Europe*.
- S. torminalis** Crantz, *Torminalia vulgaris* Schr. — A. torminal. *Europe*.

SECTION II. — *Sorbiers*. FEUILLES COMPOSÉES

- S. hybrida** L. — S. hybride. S. de Laponie. *Europe boréale*.
- var. **laciniata**. — S. H. à feuilles laciniées.
- **sambucifolia**. — S. H. à feuilles de Sureau.
- **quercifolia**. — S. H. à feuilles de Chêne.
- S. Aucuparia** L. — S. des oiseleurs. *Europe boréale*.
- var. **fastigiata**. — S. d. O. fastigié.
- **pendula**. — S. d. O. à rameaux retombants.
- **fructu luteo**. — S. d. O. à fruit jaune.
- S. americana** Pursh. — S. d'Amérique. *Etats-Unis*.
- var. **pendula**. — S. d. A. pleureur.
- S. domestica** L. — S. domestique. Cormier. *Europe*.

53* **AMELANCHIER** Medik.

- A. vulgaris** Mærch. — A. commun. *Europe*.
- A. canadensis** Torr et Gr. (*A. Botryapium* DC. *A. arborea* Michx). — A. du Canada. *Amér. sept.*

var. oblongifolia Torr et Gr. — **A. d. C.** à feuilles oblongues.
Amér. sept.

— **ovalis** Lindl. *aronia ovalis* Pers. — **A. d. C.** à feuilles ovales. *Amér. sept.*

A. alnifolia Nutt. — **A.** à feuilles d'Aune. *Côtes Pacifique.*

A melanocarpa Mouill. *Aronia melanocarpa* Nutt. — **A.** à fruits noirs. *Amér. sept.*

A. arbutifolia Mouill. *Aronia* Pers. — **A.** arbousier. *Amér. sept.*
var. pubens *Aronia pubens*, Hort. — **A. A.** pubescent hybride?

— **grandiflora** *Aronia grandifolia* Ell. — **A. A.** à grandes feuilles. *Amér. sept.*

— **floribunda** *Aronia floribunda* Spach. — **A. A.** floribond. *Chine?*

A. sorbifolia Mouill. *Aronia Sorbifolia* Spach. *Sorbus spuria* DC.
— **A.** à feuilles de Sorbier. *Hybride?*

54° **PHOTINIA** Lindl.

P. serrulata Lindl. — **P.** serrulé. *Chine.*

var. rotundifolia Hort. — **P. S.** à feuilles rondes.

P. arguta Wall (*Pourthiva* Decne). — **P.** à feuilles aiguës. *Himalaya.*

P. arbutifolia Lindl. (*Hétéromeles* J. Ræm). — **P.** à feuilles d'Arbousier. *Californie.*

55° **STRANSVÆSIA** Lindl.

S. glaucescens Lindl. — **S.** glauque. *Himalaya.*

56° **RAPHIOLEPIS** Lindl.

R. indica Lindl. — **R.** de l'Inde. *Chine.*

R. rubra Lindl. — **R.** à étamines rouges. *Chine.*

R. salicifolia Lindl. — **R.** à feuilles de saule. *Chine.*

R. Japonica Sieb. (*R. ovata* Hort.). — **R.** à feuilles ovales. *Japon.*

57° **MALUS** Tourn. — **POMMIER**

M. communis Lamk. — **P.** commun. *Europe.*

var. paradisiaca Medic. — **P. C.** paradis.

— **pusilla.** — **P. C.** doucin. *Europe.*

— **Upsaliensis.** — **P. C.** d'Upsal. *Europe sept.*

— **monstruosa.** — **P. C.** monstrueux. *Hort.*

var. heterophylla. — P. C. hétérophylle. *Origine?*

— *armeniacaefolia.* — P. C. à feuilles d'Abricotier.

M. acerba Mérat (*M. sylvestris* Mill.). — P. acerbe. *Europe.*

M. coronaria (*M. odorata* Hort.). — P. odorant *Amér. sept.*

M. angustifolia Michx, *M. sempervirens* Mill. — P. à feuilles aiguës. *Amér. sept.*

MICROCARPA Carr. — MICROCARPES

M. M. spectabilis Carr. — P. M. à bouquets. *Chine.*

var. grandiflora. — P. M. à grandes fleurs.

— *baccata* Carr. — P. M. de Sibérie.

— *Torrino* Carr. — P. M. à feuilles d'Aubépine.

— *floribunda* Carr. — P. M. floribond.

— *luteola* Carr. — P. M. à fruit jaunâtre. *Japon.*

— *kaido* Carr. — P. M. du Japon.

— *cerasiformis.* — P. M. à cerises. *Japon.*

— *sulfurea* Carr. — P. M. jaune-soufre.

— *ringo* Carr. — P. M. ringo.

— *insignis* Carr. — P. M. remarquable.

— *pulchella* Carr. — P. M. très élégant.

— *intermedia* Carr. — P. M. intermédiaire.

— *longifolia* Carr. — P. M. à longues feuilles.

— *translucens* Carr. — P. M. translucide.

— *expansa* Carr. — P. M. à fruit élargi.

— *violaceus* Carr. — P. M. à fruit violacé.

— *flammea* Carr. — P. M. à fruit flammé.

— *serotina* Carr. — P. M. tardif.

— *flavida* Carr. — P. M. à fruit blond.

— *ornata* Carr. — P. M. ornemental.

— *cærulescens* Carr. — P. M. à fruit bleuâtre.

— *pallens* Carr. — P. M. à fruit pâle.

— *præcox* Carr. — P. M. précoce.

— *aurea* Carr. — P. M. à fruit doré.

— *depressa* Carr. — P. M. à fruit déprimé.

— *brævicarpa* Carr. — P. M. à fruit court.

— *striata* Carr. — P. M. à fruit strié.

— *coccinea* Carr. — P. M. à fruit cocciné.

— *prunifolia* Carr. — P. M. à feuilles de Prunier.

— *robusta* Carr. — P. M. robuste.

- var. **spharœcarpa** Carr. — P. M. à fruit sphérique.
 — **tenuiflora** Carr. — P. M. à petites fleurs.
 — **macrantha** Carr. — P. M. à grandes fleurs.
 — **lucida** Carr. — P. M. à fruit luisant.
 — **flava** Carr. — P. M. à fruit jaune.
 — **nigra** Carr. — P. M. à fruit noir.
 — **apiosa** Carr. — P. M. pomme d'Api.

58° **PIRUS** Tournefort. — **POIRIER**

- P. communis** Lin. — P. commun. Europe.
 var. **achras**. — P. C. à fruits durs. Europe.
 — **amygdaliformis** Dill. — P. C. à feuilles d'Amandier.
Europe australe.
 — **oblongifolia** Spach. — P. C. à feuilles oblongues.
Europe australe.
P. elæagrifolia Pall. — P. à feuilles d'Olivier. *Tauride.*
P. salicifolia L. fl. — P. à feuilles de Saule. *Caucase.*
P. salvifolia DC. *P. nivalis* Jacq. — P. à feuilles de Sauge.
P. sauger. Asie mineure.
P. longipes Coss. et Dur. — P. longipède. *Algérie.*
P. Sinaica Thouin. *P. Michauxi.* — P. d'Arabie. *Asie mineure.*
P. Bollwilleriana J. Bauh. — P. de Bollwiller. *Origine hybride.*
P. pashia D. Don. *P. heterophylla* Hort. — P. hétérophylle Hort.
Népaul?
P. sinensis Lindl. — P. de la Chine.
 var. **Balansæ** Decne. — P. d. l. C. de Balansa. *Chine.*
P. usuriensis Maxim. — P. de l'Amour. *Chine sept.*
P. malifolia Spach. — P. à feuilles de Pommier. *Origine hybride.*

59° **ERIOBOTRYA** Lindl.

- E. Japonica** Lindl. — E. du Japon. *Néftier du Japon. Bibacrier. Chine et Japon.*

60° **CHENOMELES** (Lindl.). — **CHENOMÈLE**

- C. japonica** Lindl. — C. du Japon (*Cognassier du Japon*).
 var. **citriformis**. — C. d. J. à fruit citriforme.
 — **macrocarpa**. — C. d. J. à gros fruit.

- var.* **umbilicata**. — **C. d. J.** à fruit ombiliqué.
 — **Maulei**. — **C. d. J.** de Maule.
 — **rubragrandiflora**. — **C. d. J.** à grandes fleurs rouges.
 — **rosea**. — **C. d. J.** à fleurs roses.

61^e **CYDONIA** *Tourn.* — **COGNASSIER**

- C. vulgaris** *Tourn.* — **C.** commun. *Europe australe.*
var. **macrocarpa**. — **C. C.** à gros fruit (*C. d'Angers*).
 — **maliformis**. — **C. C.** à pommes.
 — **lusitanica**. — **C. C.** du Portugal (*C. à larges feuilles*).
C. sinensis *Thouin.* — **C.** de la Chine. *Chine.*

TRIBU V. — ROSACEÆ *L.* - ROSACÉES

62^e **ROSA** *L.* — **ROSIER**

- R. gallica** *L.* — **R.** français. **R.** de Provins. *France.*
R. pimpinellifolia *L.* — **R.** à feuilles de Pimprenelle. *Eur.*
R. alpina *L.* — **R.** des Alpes. *Alpes.*
R. rubrifolia *Vill.* — **R.** à feuilles rouges. *Europe.*
R. cinnamomea *L.* — **R.** Cannelle. *Europe.*
R. tomentosa *Smith.* — **R.** tomenteux. *Europe.*
R. villosa *L.* *R. pomifera*. *Kœg.* — **R.** velu. *Europe.*
R. canina *L.* — **R.** des chiens (vulg. *Églantier*). *Europe.*
R. rubiginosa *L.* — **R.** rouillé. *Europe.*
R. seraphini *Viv.* — **R.** séraphin. *Maroc.*
R. repens *R. arvensis.* — **R.** rampant. *Europe.*
R. sempervirens *L.* — **R.** toujours vert. *Europe.*
R. stylosa *Desv.* — **R.** à long style. *Europe.*
R. Moschata *Mill.* — **R.** musqué. *Perse et nord de l'Afrique?*
R. lutea *D. Don. R. eglanteria. L.* — **R.** jaune. **R.** capucin.
Asie occidentale.
var. *Persian yellow.* — **R.** de Perse. **R.** jaune. *Perse.*
 — **punicea** *Mill.* — **R.** capucine.
R. alba *L.* — **R.** blanc. *Europe centrale.*
R. centifolia *L.* — **R.** à cent feuilles. *Syrie.*
var. — **muscosa**. — **R.** moussu. *Hort.*
R. microphylla *Roxb.* — **R.** à petites feuilles. *Chine.*
R. Banksiæ *R. Br.* — **R.** banks. *Chine.*

- R. indica** L. — R. indien. *Chine*.
 var. **semperflorens** Curt. *R. diversifolia* Vent. — R. du Bengale. *Chine*.
 — **noisettiana** Bosc. — R. noisette. *Chine*.
 — **chinensis** Jacq. *R. Manetti*. — R. de Chine. *Rose thé. Chine*.
- R. Borboniana** Red. — R. de l'île Bourbon.
R. portlandica Ludw. — R. perpétuel. R. du roi. *Amérique*.
R. Lawrenceana Sweet. — R. pompon. *Chine*.
R. damascena Mill. — R. des quatre saisons.
R. hybrida Hort. — R. hybride. R. remontant.
R. Ayreshirea Lindl. — R. Ayreshire. *Europe*.
R. multiflora Thbg. — var. R. de la Grifferaie. *Chine*.
R. anemoniflora Lindl. — R. anémone. *Chine*.
R. rugosa Thbg. *R. ferox* Law. — R. rugueux. *Japon*.
R. kamtschatica Vent. — R. de Kamtschatka. *Asie*.
R. myriantha Decne. — R. à nombreuses fleurs. *Orig.?*
R. microcarpa Lindl. — R. à petits fruits. *Chine*.
R. caroliniana Michx *R. lucida* Thbg. — R. de la Caroline. *Asie sept.*
R. Brunonii Lindl. — R. de Brown. *Népaul*.
R. polyantha Sieb et Zucc. — R. polyanthe. *Japon*.

XVII. LEGUMINOSÆ. — LÉGUMINEUSES

TRIBU I. — PAPILIONACEÆ. R. Br. - PAPILIONACÉES

63° ANAGYRIS Tourn. — ANAGYRE

A. foetida L. — A. fétide. *Europe australe*.

64° ULEX L. — AJONC

- U. europæus** L. — A. d'Europe. **A. marin** *Landier. Europe occ'd.*
 var. **inermis**. — A. d'E. sans épines.
 — **flore pleno**. — A. d'E. à fleurs doubles.
U. nanus Smith. — A. nain. *Europe occidentale*.
U. parviflorus Pourr. — A. de Provence. **A.** à petites fleurs. *Région méditerranéenne*.

65° CALYCOTOME Lmk.

C. spinosa Lmk. — C. épineux. Région méditerranéenne.

66° ANTHYLLIS L. — ANTHYLLIDE

A. barba Jovis. — A. Barbe de Jupiter.

67° SPARTIUM L. — SPARTIER

S. Junceum L. — Spartier jonciforme. *Genêt d'Espagne.*
Europe mérid.

var. **flore pleno.** — S. J. à fleurs doubles.

68° GENISTA L. — GENÊT

G. scoparia DC. *Sarothamnus vulgaris* Wimmer. — Genêt à balais. France.

Genista radiata Scop. — Genêt radié. *Europe australe.*

G. candicans L. — G. blanchâtre. *Europe.*

G. tinctoria L. — G. de teinturiers (*Genestrole*). France.

G. alba Lmk. — G. blanc. *Espagne.*

G. purgans L. — G. purgatif. *Europe.*

G. sagittalis Jacq. — G. sagitté. *Europe.*

G. scorpius DC. — G. scorpion (vulg. *Épine fleurie*). Région méditerranéenne.

G. anglica L. — G. d'Angleterre. *Europe sept.*

G. horrida DC. — G. très épineux. *Europe méridionale.*

69° ARGYROLOBIUM Echl. — ARGYROLOBE

A. linnæanum Walp. — A. de Linné. *Europe mérid.*

70° CYTISUS L. — CYTISE

C. capitatus Jacq. — C. en tête. *Europe australe.*

C. hirsutus L. — C. velu. *Europe australe.*

C. elongatus Waldst. — C. allongé. *Hongrie.*

C. sessilifolius L. — Cytise à feuilles sessiles. *Europe austr*

C. nigricans L. — C. noircissant. *Europe.*

C. purpureus Scop. — C. pourpre. *Autriche.*

- var. — **ratisbonensis**. — C. P. de Ratisbonne. *Eur.*
 — — **versicolor**. — C. P. à couleurs variées.
 — — **atropurpureus**. — C. P. foncé.
 — — **pendulus**. — C. P. pleureur.

71° **LABURNUM** Griseb. — (*Cytisus* Lin).

- L. vulgare** Griseb (*Cytisus laburnum* L.). — L. commun, Cytise aubours. *Europe.*
 var. — **bullata** (*C. involuta*). — L. C. à feuilles bullées.
 — — **Watereri**. — L. C. de Waterer.
 — — **quercifolia**. L. C. à feuilles de Chêne.
 — — **pendula**. — L. C. pleureur.
L. Adami. — L. d'Adam. *Orig. hybride.*
L. alpinum Griseb. — L. des Alpes. *Alpes.*
 var. — **alschingeri**. — L. d'Alschinger. *Dalmatie.*
L. Weldeni Griseb. — L. de Welden. *Dalmatie.*

72° **CALOPHACA** Fisch.

- C. vulgarica** L. *Cytisus vulgaricus* Lin. fls. — C. du Volga. *Russie.*

73° **ADENOCARPUS** DC. — **ADENOCARPE**

- A. grandiflorus** Bois. — A. à grandes feuilles. *Rég. médit.*

74° **ONONIS** Lin. — **BUGRANE**

- O. fruticosa** L. — B. arbrisseaux. *Alpes.*

75° **ROBINIA** L. — **ROBINIER**

- R. pseudo-acacia** L. — R. faux Acacia. *Amér. sept.*
 var. **inermis**. — R. F. A. sans épines.
 — **monophylla**. — R. F. A. à une feuille.
 — **Decaisneana** (*flore roseo*). — R. F. A. de Decaisne.
 — **crispa vel undulata**. — R. F. A. à feuilles crispées.
 — **fastigiata**. — R. F. A. pyramidale.
 — **sophoræfolia**. — R. F. A. à feuilles de Sophora.
 — **umbraculifera**. — R. F. A. parasol.
 — **tortuosa**. — R. F. A. tortueux.

R. viscosa Vent. — R. visqueux. Amér. sept.

R. hispida L. — R. hispide. Amér. sept.

76° **CARAGANA** Lmk. — **CARAGAN**

C. arborescens Lmk. — C. arborescent. Sibérie.

var. **pendula**. — C. A. pleureur.

C. frutescens DC. — C. frutescent. Sibérie.

C. altagana Poir. — C. altagane. Daourie.

var. **microphylla**. — C. A. à petites feuilles.

C. spinosa DC. — C. épineux. Sibérie.

C. pygmæa DC. — C. pygmée. Sibérie.

var. **grandiflora**. — C. P. à grandes fleurs.

C. jubata Poir. — C. à crinières. Sibérie.

C. Chamlagu Lmk. — C. Chamlagu. Mongolie chinoise.

77° **HALIMODENDRON** Fisch. — **HALIMODENDRE**

H. argenteum DC. — H. argenté. Sibérie.

var. **grandiflora** Hort. — H. à grandes fleurs. Hort ?

78° **COLUTEA** L. — **BAGUENAUDIER**

C. arborescens L. — B. arborescent. Europe.

C. cruenta Ait. — B. à fleurs rougeâtres. Orient.

C. halepica Lmk. — B. d'Alep. Asie mineure.

79° **CORONILLA** Tourn. — **CORONILLE**

C. Emerus L. — C. arbrisseau (faux Séné). Europe.

80° **SOPHORA** L.

S. japonica L. — S. du Japon. Chine et Japon.

var. **pendula**. — S. pleureur.

81° **VIRGILIA** Lmk.

V. lutea Michx fils. — V. à bois jaune. Amér. sept.

V. amurensis Benth (*Maakia amurensis* Rupr). — V. de l'Amour. Asie sept.

82° **EDWARDSIA** (Salisb).

E. microphylla Salisb. — E. à petites feuilles. Nouv.-Zélande.

83° **DESMODIUM** L. — **DESMODE**

- D. racemosum** DC. L. — **D.** à grappes. Japon.
D. penduliflorum Oudem. — **D.** pleureur. Japon.
D. incanum Hort. — **D.** blanchâtre. Orig.?

84° **LESPEDEZA** Michx.

- L. bicolor** Turcz. — **L.** à deux couleurs. Région de l'Amour.
L. macrocarpa Bnge. — **L.** à gros fruit. Chine boréale.

85° **INDIGOFERA** L. — **INDIGOTIER**

- I. Dosua** Hamilt. — **I.** dosua. Himalaya.
I. decora Lindl. — **I.** décoratif. Chine.

86° **AMORPHA** L.

- A. fruticosa** L. — **A.** frutescent. Amér. sept.
A. canescens Nutt. — **A.** grisâtre. Amér. sept.

87° **WISTARIA** Nutt. — **GLYCINE**

- W. frutescens** DC. — **G.** frutescent. États-Unis.
W. chinensis DC. — **G.** de Chine. Chine.
W. brachybotrys Sieb. — **G.** à courtes grappes. Japon.
W. multijuga Sieb. — **G.** à grandes fleurs. Japon.

TRIBU II. — **CESALPINIÆ. R. Br. - CÉSALPINÉES**88° **CERCIS** L. — **GAINIER**

- C. siliquastrum** L. — **G.** arbre de Judée. Rég. médit.
C. canadensis L. — **G.** du Canada. États-Unis.
C. chinensis Bnge. — **G.** de la Chine.

89° **CERATONIA** L. — **CAROUBIER**

- C. siliqua** L. — **C.** commun. Rég. médit.

90° **GLEDITSCHIA** Lin. — **FÉVIER**

- G. triacanthos** L. — **F.** à trois épines. F. d'Amérique. Amér. sept.

- var. **inermis**. — F. d'A. sans épines.
 — **pendula** C. Bujotii. — F. pleureur. F. de Bujot.
G. ferox Desf. (*G. orientalis* Bosc). — F. féroce. Chine.
 var. **subinermis**. — F. F. subinorme. Chine.
G. sinensis Lmk. — F. de la Chine. Chine.
G. macracantha Desf. (*G. Fontanesii* Spach). — F. à
 grosses épines. Chine.
G. Caspica Desf. — F. de la Caspienne. Asie occid.

91° **GYMNOCLADUS** Lmk. — **CHICOT**

- G. canadensis** Lmk. *Guilandina* Bonduc L. — G. du Canada.
 Amér. sept.

TRIBU III. — MIMOSEÆ. - MIMOSÉES

92° **ACACIA** (Willd).

- A. Julibrissin** (Willd). — Mimosa Julibrissin. Arbre de
 soie. Orient.

XVIII. TEREBINTHACEÆ. — TÉRÉBINTHACÉES

93° **PISTACIA** L. — **PISTACHIER**

- P. lentiscus** L. — P. lentisque. Rég. médit.
P. terebenthus L. — P. térébinthe. Rég. médit.
P. vera L. — P. cultivé. Rég. médit.

94° **RHUS** Lin. — **SUMAC**

- R. Cotinus** L. — S. fustet, arbre à perruque. Europe australe.
 var. **purpureus**. — S. pourpre.
R. toxicodendron L. — S. vénéneux Amér. sept.
 var. **radicans**. — S. V. radicant. Amér. sept.
Rhus juglandifolia Wall. (*R. vernix* L.) *R. vernicifora* DC.
 — Sumac à feuilles de Noyer. Japon.
R. aromatica Ait. — S. aromatique. Amér. sept.
R. suaveolens Ait. — S. odorant. Amér. sept.

- R. semialata** L. *R. Osbeckii* DC. — **S.** à feuilles ailées. *Jap.*
R. copallina L. — **S.** copal. *Caroline.*
R. typhina L. — **S.** de Virginie. **S.** amarante. *États-Unis.*
R. coriaria L. — **S.** des corroyeurs, vinaigriers. *Rég. médit.*
R. glabra L. — **S.** glabre. *Amér. boréale.*
var. laciniata. — **S. G.** à feuilles laciniées.

XIX. LYTHRARIACEÆ. — LYTHRARIACÉES

95° **NESCEA** Commers.

- N. salicifolia** H. B. K. — **N.** à feuilles de Saule. *Mexique.*

96° **LAGERSTRÆMIA** Lin. — **LAGERSTROMIE**

- L. indica** L. — **L.** de l'Inde. *Chine.*

XX. PASSIFLOREÆ. — PASSIFLORÉES

97° **PASSIFLORA.** Juss. — **PASSIFLORE**

- Passiflora cærulea** L. — **P.** à fleurs bleues. *Amér. sept.*

XXI. ARISTOLOCHIÆ. — ARISTOLOCHIACÉES

98° **ARISTOLOCHIA** L. — **ARISTOLOCHE**

- A. siphon** L'Her. — **A.** siphon. *Amér. sept.*
A. tomentosa. — **A.** tomenteux. *Caroline.*

XXII. SAXIFRAGACEÆ. — SAXIFRAGACÉES

99° **RIBES** L. — **GROSEILLIER**

SECTION I. — *Rameaux épineux.*

- R. speciosum** Pursh (*R. fuchsoides* Bert) (*Robsonia* Spach).
 — **G.** élégant. *Californie.*

- R. lacustre** Poir. — **G.** des lacs, **G.** bicolore. *Amér. sept.*
R. subvestitum Hook et Arn. — **G.** à rameaux velus. *Californie.*
R. grossularia L. (*R. Uva-crispa* DC.). — **G.** épineux. *Europe.*
var. hirsuta. — **G. E.** à fruits hérissés.
 — **macrocarpa.** — **G. E.** à maquereaux. *Hort.*
R. divaricatum Dougl. — **G.** divariqué. *Amér. sept.*
R. Cynosbati L. — **G.** cynosbat. *Amér. sept.*
R. niveum Lindl. — **G.** à fruit blanc. *Amér. sept.*
R. diacantha Pall. — **G.** à deux épines. — *Sibérie.*
R. Menziesii Pursh. — **G.** de Menzies. *Amér. sept.*

SECTION II. — Rameaux non épineux.

- R. resinosum** Sims (*R. orientale* Desf.). — **G.** résineux. *Syrie.*
R. opulifolium Hort. — **G.** à feuilles d'Obier. *Russie.*
R. alpinum L. *R. stérile* Hort. — **G.** des Alpes. *Europe.*
R. petræum Wulf (*R. triste* Pallas). — **G.** des rochers. *Europe et Sibérie.*
R. prostratum L'Hérit. — **G.** décombant. *Amér. sept.*
R. saxatile Pallas. — **G.** des rocailles. *Sibérie.*
R. vitifolium Hort. (*R. multiflorum* Kit.). — **G.** à feuilles de Vigne. *Europe et Orient.*
R. rubrum L. — **G.** rouge. *Europe.*
var. fructu albo. — **G.** à fruits blancs.
R. nigrum L. — **G.** noir (*Cassis*). *Europe et Asie.*
var. fructu flavescente. — **G. N.** à fruit jaune.
 — **heterophylla.** — **G. N.** à feuilles laciniées.
 — **variegata.** — **G. N.** à feuilles panachées.
R. floridum L'Hérit. — **G.** de la Floride. *Amér. sept.*
R. Gordonianum. — **G.** de Gordon Hort. *Angleterre.*
var. Billardi Hort. — **G. d. G.** de Billard Hort.
R. sanguineum Pursh. — **G.** sanguin. *Amér. sept.*
var. malvaceum Hort. — **G. S.** mauve. *Amér. sept.*
R. Aureum Pursh. *R. fragrans* Lodd (*R. palmatum-aureum* Hort. *R. palmatum* Desf. *Chrysobotryon revoluta.* Spach).
 — **G.** doré. *Amér. sept.*
R. tenuiflorum Lindl. — **G.** à petites fleurs. *Amér. sept.*

100° **HYDRANGEA, L. — HORTENSIA**

- H. arborescens** L. — **H.** arborescent. *Pensylvanie.*
H. nivea Michx. — **H.** blanc. *Amér. sept.*
var. canescens. — **H.** B. [grisâtre. *Hort.*
H. japonica Sieb et Zucc. — **H.** du Japon. *Chine et Japon.*
H. Asizai Sieb et Zucc. — **H.** Asizaï. *Japon.*
H. Otaksa Sieb et Zucc. — **H.** Otaka. *Japon.*
H. paniculata Sieb et Zucc. — **H.** paniculé. *Japon.*
H. involucrata Sieb et Zucc. — **H.** involucre. *Japon.*

101° **ESCALLONIA Mutis.**

- E. rubra** Pers. — **E.** rouge. *Chili.*
E. floribunda H. B. K. — **E.** floribond. *Nouv.-Grenade.*

102° **ITEA L.**

- I. virginica** L. — **I.** de Virginie. *États-Unis.*

103° **PLATANUS Town.**

- P. vulgaris** *var. orientalis* Spach. — **P.** commun. *Orient.*
var. cuneata. — **P.** à feuilles en coin.
 — **occidentalis** Sp. — **P.** d'Occident. *Amér. sept.*

XXIII. HAMAMELIDEÆ. — HAMAMÉLIDÉES104° **HAMAMELIS L.**

- H. virginica** L. — **H.** de Virginie. *Amér. sept.*

105° **FOTHERGILLA L.**

- F. alnifolia** L. — **F.** à feuilles d'Aune. *Virginie.*

106° **CORYLOPSIS Sieb. et Zucc.**

- C. spicata** Sieb et Zucc. — **C.** à épis. **C.** du Japon. *Jap.*

107° **PARROTIA C. A. Meyer.**

- P. persica** C. A. Mey. — **P.** de Perse (*Bois de fer*). *Perse.*

108° **EUPTELEA** *Sieb et Zucc.*

E. polyandra *Sieb et Zucc.* — **E. polyandre.** *Japon.*

XXIV. PHILADELPHIÆ. — PHILADELPHIÉES109° **PHILADELPHUS** *L.* — **SERINGAT**

P. coronarius *L.* — **S.** commun. **S.** des couronnes. *Europe australe et Orient.*

var. **Zeyheri.** — **S. C.** de Zeyher. *Hort.*

— **nanus.** — **S. C.** nain.

P. Satzumi. *Paxt. P. Ledebourii Hort.* — **S.** de Satzumi. *Japon.*

P. inodorus *L. P. grandiflorus Willd. P. lacus Hort. P. cordifolius Hort.* — **S.** inodore. *Amér. sept.*

P. latifolius *Schrad.* — **S.** à grandes feuilles. *Amér. sept.*

P. gardonianus *Lindl.* — **S.** de Gardon. *Californie.*

P. Californicus *Benth. P. Lewisii. Pursh.* — **S.** à feuilles luisantes. *Californie.*

P. Philadelphus *hirsutus Nutt.* — **S.** hérissé. *Amér. sept.*

P. Mexicanus *Schlecht.* — **S.** du Mexique.

110° **DEUTZIA** *Thunbg.*

D. scabra *Thbg.* — **D.** scabre. *Japon.*

var. — **crenata** *Sieb et Zucc.* — **D. S.** crénelé. *Japon.*

— — **flore purpureo pleno.** — **D. S.** à fleurs doubles pourpres.

— — **albo pleno** *D. candidissima Hort.* — **D. S.** blanc à fleurs doubles.

D. gracilis *Sieb et Zucc.* — **D.** grêle. *Japon.*

var. — **flore pleno.** — **D. G.** à fleurs doubles.

D. staminea *R. Br.* — **D.** blanchâtre. *Népaul.*

XXV. CORNÆÆ. — CORNÉES111° **CORNUS** *Tourn.* — **CORNOUILLER**

C. mas *L.* — **C.** mâle. *Europe.*

- var. **macrocarpa**. — **C. M.** à gros fruits.
 — **fructu luteo**. — **C. M.** à fruits jaunes.
 — **heterophylla**. — **C. M.** hétérophylle.
 — **nana**. — **C. M.** nain.
- C. sanguinea** L. — **C.** sanguin. *Europe*.
 var. **variegata**. **C. S.** à feuilles panachées.
- C. alba** L. — **C.** à fruits blancs. *Amérique*.
 var. **speciosa**. — **C. B.** remarquable.
- C. florida** L. — **C.** de la Floride. *Amér. Nord*.
- C. sericea** L'Hérit. *C. caerulea* Lmk. — **C.** soyeux. *Amér. sept.*
- C. acuminata** Hort. — **C.** acuminé. *Origine?*
- C. rugosa** Lmk. *C. circinnata* L'Hérit. — **C.** rugueux. *Amér. sept.*
- C. citrifolia** Hort. *C. paniculata* L'Hérit. — **C.** à feuilles de Citronnier. *Amér. sept.*
- C. tartarica** *C. sibirica* Lodd. — **C.** de Tartarie.
- C. alternifolia** L. — **C.** à feuilles alternes. *Amér. sept.*

412° **BENTHAMIA** Lindl.

- B. fragifera** Lindl. — **B.** porte-fraises. *Népaul*.

413° **AUCUBA** Thbg.

- A. japonica** Thbg. — **A.** du Japon. *Japon*.
 var. **maculata**. — **A. d. J.** à feuilles maculées.
 — **punctata**. — **A. d. J.** à feuilles ponctuées.
 — **salicifolia**. — **A. d. J.** à feuilles lancéolées.

XXVI. CAPRIFOLIACÆ. — CAPRIFOLIACÉES

TRIBU I. — LONICERÆ. - LONICÉRÉES

414° **LONICERA** L. — **CHÈVREFEUILLE**SECTION I. — *Tige sarmenteuse.*

- L. caprifolium** L. — **C.** commun. *Europe*.
L. etrusca Santi. — **C.** de Toscane. *Italie*.
L. periclymenum L. — **C.** des bois. *Europe*.

- L. parviflora** Lmk L. *glauca* Hort. — **C.** à petites fleurs.
C. glauque. *Amér. sept.*
- L. coccinea** Pursh L. *sempervirens* Ait. — **C.** à fruit écarlate. *Amér. sept.*
var. major. — **C.** cocciné à grandes feuilles.
- L. occidentalis** Stenud L. *ciliatum* Dougl. — **C.** d'Occident.
C. cilié. *Amér. sept.*
- L. flava** Sims L. *fraseri* Pursh. — **C.** jaune. *Carolines.*
- L. Chinensis** Wats. — **C.** de la Chine. *Chine.*
var. brachypoda. — **C.** d. l. **C.** à courts pédoncules. *Japon.*
 — **reticulata.** — **C.** d. l. **C.** réticulé. *Hort.*
- L. confusa** DC. L. *Japonica* Thbg. — **C.** confus. *Chine et Japon.*

SECTION II. — *Chamœcerasus.* — *Chamécérisiens.*

- L. Xylosteum** L. — **C.** à balais. *Europe.*
- L. nigra** L. — **C.** noir. *Europe.*
- L. Iberica** M. Bieb. — **C.** d'Ibérie. *Géorgie.*
- L. cærulea** L. L. *altaica* Pall. — **C.** bleu. *Europe et Sibérie.*
- L. Caucasica** Pall. L. *orientalis* Lmk. — **C.** d'Orient.
Géorgie.
- L. Moraviae** Hort. — **C.** de Moravie. *Europe et Orient.*
- L. Ruprechtiana** Reg. — **C.** de Ruprecht. *Fleuve Amour.*
- L. chrysantha** Turcz. — **C.** à fleurs dorées. *Chine sept.*
- L. fragrantissima** Paxt. — **C.** odorant. *Chine.*
- L. Standishii** Lesc. — **C.** de Standish. *Chine.*
- L. Ledebourii** Eschsch. — **C.** de Ledebour. *Californie.*
- L. alpigena** L. L. *Webbiana* Wall. — **C.** des Alpes. **C.** de Webb. *Alpes et Himalaya.*
- L. nummulariaefolia** Hort. — **C.** à feuilles arrondies. *Orig.?*
- L. Tatarica** L. — **C.** de Tartarie. *Russie et Sibérie.*
var. rubra grandiflora. — **C.** d. **T.** à grandes fleurs rouges.
 — **alba grandiflora.** — **C.** d. **T.** à grandes fleurs blanches.
 — **fructu luteo.** — **C.** d. **T.** à fruits jaunes.
- L. uniflora** Blm. — **C.** à une fleur. *Japon.*
- L. translucens** Decne. — **C.** à fruit translucide. *Origine?*

115° ABELIA Rr. Br.

- A. uniflora** R. Br. — **A.** à une fleur. *Chine.*
A. Chinensis R. Br. — **A.** de la Chine. *Chine.*

116° LEYCESTERIA Wall.

- L. formosa** Wall. — **S.** élégant. *Népaul.*

117° SYMPHORICARPOS Dill. — SYMPHORINE

- S. racemosus** Michx. — **S.** en grappes. *Amér. sept.*
var. macrocarpa — **S.** en **G.** à gros fruits.
S. parviflora Desf. *S. vulgaris* Michx. — **S.** à petites fleurs.
États-Unis.
S. montanus Hbks, *mexicanus* Hort. — **S.** des montagnes.
Mexique.

[118° DIERVILLA Tourn. — WEIGELIA

- D. canadensis** Tourn. — **D.** du Canada.
var. sessilifolia. — **D.** de **C.** à feuilles sessiles. *Iles Carolines.*
D. japonica. *Thumb Weigelia* — **D.** ou **W.** du Japon.
var. rosea. — **D.** d. **J.** à fleurs roses.
 — **hortensis.** — **D.** d. **J.** des jardins.
 — **grandiflora.** — **D.** d. **J.** à grandes fleurs.
 — **Lavallei** Lemoine. — **D.** d. **J.** de Lavallée.

TRIBU II. — SAMBUCEÆ. - SAMBUCÉES

119° SAMBUCUS Tourn. — SUREAU

- S. nigra** L. — **S.** noir. *Europe.*
var. foliis variegatis. — **S. N.** à feuilles panachées.
 — **laciniata.** — **S. N.** à feuilles laciniées.
 — **rotundifolia.** — **S. N.** à feuilles rondes.
 — **stricta.** — **S. N.** dressé.
 — **munstruosa.** — **S. N.** à rameaux aplatis.
 — **fructu alba.** — **S. N.** à fruits blancs.
 — **virescens.** — **S. N.** à fruits verdâtres.
S. canadensis. — **S.** du Canada. *Amér. sept.*

- S. pubens** Michx. — **S.** pubescent. *Amér. sept.*
var. Fontaneti. — **S. P.** de Desfontaine.
S. racemosa L. — **S.** à grappes. **S. rouge.** *Europe.*
var. variegata. — **S.** à **G.** panaché.

120° **VIBURNUM** Lin. — **VIORNE**

- V. lantana** L. — **V.** flexible. **V.** mancienne. *Europe.*
V. opulus L. — **V.** aubier (*Sureau d'eau*). *Europe.*
var. sterilis. — **V. A.** stérile (*Boule de neige*).
 — **nana.** — **V. A.** naine.
V. rugosum Pers. — **V.** rugueuse. *Canaries.*
V. prunifolium L. — **V.** à feuilles de Prunier. *Caroline.*
V. pirifolium Poir. — **V.** à feuilles de Poirier. *Pensylvanie.*
V. plicatum Thunb. — **V.** pliée. *Japon.*
Viburnum macrocephalum Fortune. — **V.** à grosse
 inflorescence (*à grosses têtes*). *Chine.*
V. Awafuski Lindl. — **V.** de la Chine.
V. Himalayense V. *Fortunei* Hort. — **V.** de l'Himalaya.
V. lentago L. — **V.** à manchettes. *États-Unis.*
V. suspensum Hort. — **V.** élevée. *Japon.*
V. Tinus. — **V.** Tin (*Laurier-Tin*). *Europe mérid.*
var. foliis variegatis. — **V. T.** à feuilles panachées.

XXVII. RUBIACEÆ. — RUBACIÉES

121° **CEPHALANTHUS** Lin. — **CÉPHALANTHE**

- C. occidentalis** L. — **C.** d'occident. *Amér. sept.*

XXVIII. ARALIACEÆ. — ARALIACÉES

122° **ARALIA** (Tourn).

- A. spinosa** L. — **A.** épineux (vulg. *Angélique épineuse*).
Amér. sept.
A. chinensis *Dimorphanthus elatus* Miquel. — **A.** de la Chine.
A. pentaphylla Thunb. — **A.** à cinq feuilles. *Japon.*
A. ricinifolia Sieb et Zucc *Panax spinosum* L. fil. — **A.** à
 feuilles de Ricin. *Japon.*

A. Sieboldii Henders (*Fatsia Dene*). — A. du Japon.

123° **HEDERA** L. — **LIERRE**

H. Helix. — L. grimpant. *Europe et Asie.*

var. **Algeriensis.** — L. G. d'Algérie.

— **hibernica.** — L. G. d'Irlande.

— **Rægneriana** (*Cordifolia*). — L. G. du Caucase.

— **doneraillensis** (*parvifolia*). — L. G. à petites feuilles.

— **macrophylla.** — L. G. à grandes feuilles.

— **palmata** (*digitala*). — L. G. à feuilles palmées.

— **foliis variegatis.** — L. G. à feuilles panachées.

— **marmorata.** — L. G. à feuilles marbrées.

— **chrysocarpa.** — L. G. à fruit jaune.

XXIX. UMBELLIFERÆ. — OMBELLIFÈRES

124° **BUPLEURUM** Lin. — **BUPLÈVRE**

B. fruticosum L. — B. ligneux. *Europe mérid.*

XXX. RHAMNÆ. — RHAMNÉES

125° **PALIURUS** Tourn. — **PALIURE**

P. aculeatus Lmk. — P. épineux (*Porte-chapeaux*). *Rég. médit.*

126° **ZIZYPHUS** Tourn. — **JUJUBIER**

Z. jujuba L. — J. cotonneux. J. à crinière. *Asie.*

Z. vulgaris Lmk. — J. commun. *Rég. médit.*

Z. sinensis Lmk. — J. de la Chine.

127° **BERCHEMIA** Neck.

B. volubilis. — B. grimpant. *Amér. sept.*

128° RHAMMUS Lmk. — NERPRUN

SECTION I. — *Nerpruns vrais.*

- R. alaternus** L. — **N.** alaterne. *Rég. médit.*
var. foliis variegatis. — **N. A.** à feuilles panachées.
- R. hybridus.** — **N.** hybride. *Origine hybride.*
var. Billardi. — **N.** de Billard.
- R. alpinus** L. — **N.** des Alpes. *Europe.*
- R. californicus** Eschsch. — **N.** de Californie.
- R. libanoticus** Boiss. — **N.** du mont Liban.
- R. castaneifolius** Hort. — **N.** à feuilles de Châtaignier.
Asie occidentale.
- R. catharticus** L. — **N.** purgatif. *Europe.*
- R. infectorius** L. — **N.** des teinturiers (vulg. *Graine d'Avignon*). *Europe.*
- R. saxatilis** L. — **N.** des rochers. *Europe.*
- R. pyrifolius** Deene. — **N.** à feuilles de Poirier. *Origine ?*
- R. utilis** Decne *R. viridis* (Hort.). — **N.** utile. *Chine.*
- R. bapticus** Decne. — **N.** de baptiste. *Chine sept.*
- R. pumilus** L. *R. rupestris.* Vill. — **N.** nain. *Europe.*

SECTION II. — *Frangula.*

- R. frangula** L. — **N.** bourdaine (*bourgène*). *Europe.*
var. heterophylla. — **N. B.** hétérophylle.
 — **nana.** — **N. B.** naine.
- R. Purshiana** DC. *R. alnifolius* Pursh. — **N.** de Pursh.
Amér. sept.
- R. latifolius** L'Hérit. — **N.** à larges feuilles. *Açores et Madère.*

129° CEANOTHUS L. — CEANOT

- C. azureus** Desf. — **C.** azuré. *Mexique.*
var. Delilianus Spach. — **C.** de Delile.
- C. americanus** L. — **C.** d'Amérique. *États-Unis.*
var. corymbosa. — **C. d'A.** en corymbe.
 — **gloire de Versailles.**

var. **gloire de Vaise.**

— **Lucie Simon.**

— **Lucie Moser.**

C. Fontanesianus. — **C.** de Desfontaines. *Amér. sept.*

C. divaricatus. — **C.** divarique. *Amér. sept.*

130° **COLLETIA** *Commerson.*

C. cruciata *Gill et Hook.* — **C.** en croix. *Chili.*

C. ferox *Gill. et Hook.* — **C.** féroce. *Chili.*

131° **HOVENIA** *Thumb.*

H. dulcis *Thunb.* — **H.** à fruits doux. *Japon.*

XXXI. CELASTRINEÆ. — CÉLASTRINÉES

132° **CELASTRUS** *L.* — **CELASTRE**

C. scandens *Lin.* — **C.** grimpant. *Amér. sept.*

C. Oryza *Sieb et Zucc.* — **C.** Oryza. *Japon.*

C. paniculatus *Willd.* — **C.** paniculé. *Japon.*

133° **EVONYMUS** *L.* — **FUSAIN**

SECTION I. — **A FEUILLES CADUQUES**

E. europæus *L.* — **F.** d'Europe. *Europe.*

var. **purpureus.** — **F.** d'E. pourpre.

— **leucocarpa.** — **F.** d'E. à fruits blancs.

— **nanus.** — **F.** d'E. nain.

E. verrucosus *Scop.* — **F.** verruqueux. *Autriche.*

E. latifolius *Scop.* — **F.** à larges feuilles. *Alpes.*

E. alatus. *Thunb.* — **F.** à rameaux ailés. *Japon.*

E. atropurpureus *Jacq.* — **F.** pourpre noir. *Amér. sept.*

E. americanus. — **F.** d'Amérique.

SECTION II. — A FEUILLES PERSISTANTES

- E. japonicus** *Thunb.* — F. du Japon. *Asie centrale et Japon.*
var. gracilis. — F. d. J. grêle.
 — *fastigiata.* — F. d. J. pyramidal.
 — *microphylla.* — F. d. J. à petites feuilles.
 — *flavescens.* — F. d. J. jaunâtre.
 — *foliis marginatis.* — F. d. J. à feuilles marginées.
 — *variegata.* — F. d. J. à feuilles panachées.
 — *foliis maculatis aureis.* — F. d. J. à feuilles maculées dorées.
 — *foliis argenteis.* — F. d. J. à feuilles panachées argentées.
 — *tricolor.* — F. tricolore (*Duch. d'Anjou*).
E. Carrieri (*Museum Paris*). — F. de Carrière. *Origine ?*
E. radicans *Sieb et Zucc.* — F. rampant. *Japon.*
var. foliis argenteis. — F. R. à feuilles argentées.
 — *roseo marginata.* — F. R. à feuilles roses marginées.
E. nanus *M. Bieb.* — F. nain. *Caucase.*
var. pulchella. E. linifolius Hort. — F. N. élégant.
E. augustifolius *Pursh E. rosmarinifolius Hort.* — F. à feuilles aiguës. *Géorgie.*
var. repens. — F. à F. A. rampant.
E. fimbriatus *Wall.* — F. frangé. *Indes orientales.*

XXXII. BUXACEÆ. — BUXACÉES

131° BUXUS L. — BUIS

- B. sempervirens** *L.* — B. toujours vert. *Europe.*
var. pyramidata. — B. T. V. pyramidal.
 — *rotundifolia.* — B. T. V. à feuilles rondes.
 — *augustifolia.* — B. T. V. à feuilles étroites.
 — *microphylla.* — B. T. V. à petites feuilles.
 — *variegata.* — B. T. V. à feuilles panachées.
 — *suffruticosa (nana).* — B. T. V. nain.
B. balearica *Willd.* — B. des Baléares.
B. Japonica. *Mull.* — B. du Japon.

- var. Fortunei.* — **B. J.** à larges feuilles. *Japon.*
B. longifolia Boiss. — **B.** à longues feuilles. *Asie.*
B. chinensis Lmk. — **B.** de la Chine. *Chine et Japon.*

135° **SARCOCOCCA** Lindl.

- S. pruniformis** Lindl. — **S.** pruniforme. *Népaul.*

XXXIII. ILICINEÆ. — ILICINÉES

136° **ILEX** Lin. — **HOUX**

- I. aquifolium** L. — **H.** commun. **H.** à feuilles piquantes. *Europe.*
var. latifolia. — **H. C.** à larges feuilles.
 — **balearica.** — **H. C.** de Mahon.
 — **ferox.** — **H. C.** hérisson.
 — — **variegata.** — **H.** hérisson panaché.
 — **fulhamensis.** — **H. C.** de Fulham.
 — **altaclarensis.** — **H. C.** à feuilles planes larges.
 — **latispina.** — **H. C.** à larges épines.
 — **Doningtonensis.** — **H. C.** de Donington.
 — **calamistrata.** — **H. C.** à feuilles crispées.
 — **serratifolia.** — **H. C.** à feuilles en scie.
 — **variegata.** — **H. C.** serrulé à feuilles panachées.
 — **scotica.** — **H. C.** d'Écosse.
 — **ovata.** — **H. C.** à feuilles ovales.
 — **laurifolia.** — **H. C.** à feuilles de Laurier.
 — **sulphurea.** — **H. C.** jaune-soufre.
 — **flammea.** — **H. C.** flamboyant.
 — **sinescens.** — **H. C.** sans épines.
 — **purpuracens.** — **H. C.** purpurescent.
I. Balearica Desf. — **H.** des Baléares.
I. cornuta Lindl. — **H. C.** *Chine sept.*
var. furcata. — **H. C.** à feuilles bifurquées.
I. latifolia Thunb. — **H.** à larges feuilles. *Japon.*
var. Tarajo. — **H.** Tarajo.
I. Maderensis Lmk *I. Perrado* Ait. — **H.** de Madère.
I. sinensis Sims. — **H.** de Chine. *Chine.*

- I. Japonica** Thunb. — **H.** du Japon. Japon.
I. cassine Walter. *I. Vomitoria* Ait — **H.** Cassine. Caroline.
I. Dahoon Walt. *I. phillyræfolia*. Hort. — **H.** de Dahoon.
Amér. sept.
I. opaca Ait. — **H.** opaque. *Amér. sept.*

137^e **PRINOS** L. — **APALANCHE**

- P. glaber** L. — **A.** glabre. *Amér. sept.*
P. deciduus DC. *Ilex æstivalis* Lmk. — **A.** à feuilles caduques. *Amér. sept.*
P. verticillata L. — **A.** verticillé. *Amér. sept.*
P. glauca Hort. *Segr.* — **A.** glauque. *Origine ?*

XXXIV. AMPELIDÆ. — AMPÉLIDÉES

138^e **VITIS** Lin. — **VIGNE**

- V. vinifera sylvestris** L. — **V.** vinifère sauvage. *Europe, Asie et Afrique.*
var. laciniosa. — **V.** vinifère à feuilles laciniées.
V. Labrusca L. — **V.** ferrugineuse. *Amér. sept.*
var. Alexander's. — **V.** d'Alexandre. *Amér. sept.*
 — **Élisabeth.**
 — **Union village.**
 — **Ives seedling.**
 — **Isabelle.**
 — **Arrot.**
 — **Rentz.**
 — **Creveling.**
 — **Telegraph** (*A. Bush.*).
 — **Concord.**
 — **Catawba.**
 — **Diana.**
V. candicans Engelm. *V. mustangensis* Buckl. *V. caribæa*
var. coriacea chapm. — **V.** blanchâtre, Mustang. *Texas.*
V. monticola Buckl. — **V.** des montagnes. *Texas.*
V. Linsecumii Buckl. — **V.** de Linsecum. *Texas.*
V. Æstivalis Michx. — **V.** æstivale. *États-Unis.*
var. Cynthiana.

- var.* **Hermann.**
 — **Black-July.**
 — **Cunningham.**
Harwood.
Herbement.
Jacquez.
 — **Néosho.**
V. riparia Michx. — **V.** des rivages. *Amér. sept.*
var. **Clinton.**
 — **baron Perrier.** — **V.** Rip. sauvage.
 — **tomenteux.**
 — **Solonis.**
 — **Taylor.**
V. Rupestris Lin. — **V.** des rochers. *Arkansas.*
V. Cordifolia Michx. — **V.** à feuilles cordiformes. *États-Unis.*
V. Berlandieri Planch. — **V.** de Berlandier. *Texas.*
V. arizonica Engelm. — **V.** d'Arizona. *États-Unis.*
V. californica Benth. — **V.** de Californie.
V. cinerea Engelm. — **V.** cendrée. *Louisiane.*
V. amurensis Ruprecht. — **V.** du fleuve Amour. *Asie sept.*
V. Pagnuccii Rom. du Caill. — **V.** de Pagnucci. *Chine.*
V. Romaneti Rom. du Caill. — **V.** de Romanet. *Chine.*
V. fleifolia Buge Spinovitis Davidii. Rom. — **V.** à feuilles de Figuier. *Chine.*
V. Retordi Rom. — **V.** de Retord. *Tonkin.*
V. roduntifolia Michx. — **V.** à feuilles rondes.
var. **scupernong.** — **V. M.** à fruits blancs.

Hybrides :

- H. Labrusca: York Madeira.**
 — **Delaware.**
 — **Noah.**
 — **Othello.**
 — **Senasqua.**
 — **Salem.**
H. Æstivalis: Alvey.
 — **Lumelan.**
 — **Rulander.**

H. Riparia: Black Pearl.

- **cornucopia.**
- **Elvira.**
- **vialla.**

H. indéterminé. Autuchon.

- **Canada.**

139° **AMPELOPSIS Michx.**

A. cordata Michx. — **A.** à feuilles en cœur. *Amér. sept.*

A. vitifolia Planch. *A. platanifolia Carr.* — **A.** à feuilles de Vigne. *Perse.*

A. heterophylla Sieb et Zucc. — **A.** hétérophylle. *Amér. sept.*

var. **humulifolia Hook.** — **A. H.** à feuilles de Houblon. *Chine sept.*

— **aconitifolia Buge.** — **A. H.** à feuilles d'Aconit. *Chine sept.*

— **serjaniæfolia Regel.** — **A. H.** à feuille de Serjania. *Chine boréale.*

A. bipinnata Michx. — **A.** bipenné. *Caroline et Virginie.*

A. orientalis Planch. — **A.** d'Orient. *Asie mineure.*

140° **PARTHENOCISSUS Planch.** — **VIGNE-VIERGE**

P. quinquefolia Pl. Amp. quinquefolia Michx. — **V.** à cinq feuilles. *Amér. sept.*

var. **hederacea Hort.** — **V. V.** à feuilles de Lierre.

— **pubescens.** — **V. V.** pubescente.

— **macrophylla.** — **V. V.** à grandes feuilles.

P. himalayana Pl. — **V. V.** de l'Himalaya. *Asie.*

P. tricuspidata Pl. vitis inconstans Miq. — **V.** changeante. *Japon.*

var. **Weitchii Hort.** — **V. V.** de Weitch. *Japon.*

141° **CISSUS Linné.**

C. Japonica Willd. — **C.** du Japon. *Japon et Nouv.-Calédonie.*

C. Baudiniana Pl. C. antarctica Vent. — **C.** antarctique. *Australie.*

XXXV. ACERINEÆ. — ACÉRINÉES

142° ACER Tourn. — ÉRABLE

§ 1. FLEURS EN GRAPPES

- A. pseudo-platanus** L. — E. Sycomore. E. faux Platane.
Europe.
- var. **purpurea**. — E. S. à feuilles pourpres.
— **aureo variegata**. — E. S. à feuilles panachées.
- A. macrophyllum** Pursh. — E. à grandes feuilles. Amér.
sept.
- A. tataricum** L. — E. de Tartarie. *Asie.*
- var. **laciniata** A. *ginnala* Maxim. — E. d. T. à feuilles laciniées. *Chine sept.*
- A. Pensylvanicum** L. A. *striatum* Lmk. — E. jaspé. Amér.
sept.
- A. spicatum** Lmk. A. *montanum* Ait. — E. à épis. Amér. *sept.*
- A. campestre** L. — E. champêtre. *Aceraille. Europe.*

§ 2. FLEURS EN CORYMBES

- A. platanoïdes**. — E. plane. *Europe.*
- var. **dissecta** (*palmatifida*). — E. P. palmatifide.
— **crispa**. — E. P. à feuilles crépues.
— **cucullata**. — E. P. à feuilles cucullées.
— **purpurea**. — E. P. à feuilles pourpres.
— **Schwedlerii**. — E. P. de Schwedler.
- A. Lobelii** Ten. — E. de Lobel. *Italie.*
- A. saccharinum** Michx f. — E. à sucre. Amér. *sept.*
- A. nigrum** Michx f. — E. noir. Amér. *sept.*
- A. creticum** Tourn. — E. de Crète. *Europe australe.*
- A. monspessulanum** L. — E. de Montpellier. *Europe.*
- A. opulifolium** Vill. A. *opulus* Ait. — E. à feuilles d'Obier.
Europe.
- var. **neapolitanum**. — E. à F. d'O. de Naples. *Europe mérid.*
- A. lætum** C. A. *May*, A. *colchicum* Hartw. — E. de la Colchide. *Caucase.*
- A. eriocarpum** Michx f. A. *dasycarpum* Willd. — E. à fruits velus. Amér. *sept.*

- var. wagneri* (*laciniata*). — E. à F. V. à feuilles laciniées.
A. rubrum L. — E. rouge. *Amér. sept.*
A. Japonicum Thunb. — E. du Japon. *Japon.*
var. cratægifolium. — E. d. J. à feuilles de *Cratægus*.
 — **polymorphum** Sieb et Zuc. — E. d. J. polymorphe.
 — — **dissectum**. — E. P. à feuilles laciniées.
 — — **atropurpureum**. — E. P. à feuilles
 pourpres.
 — — **septemloba**. — E. P. à sept lobes.
 — — **ornata**. — E. P. ornemental.
A. oblungum Wallich. — E. à feuilles oblongues. *Népaul.*
A. negundo Michx f. — E. negondo. *Amér. sept.*
var. laciniata. — E. N. à feuilles laciniées.
 — **variegata**. — E. N. à feuilles panachées.
 — **violacea**. — E. N. à feuilles violacées.
 — **californica**. — E. N. de Californie.
 — **cissifolia**. — E. N. à feuilles de *Cissus*.

XXXVI. SAPINDACEÆ. — SAPINDACÉES

TRIBU I. — SAPINDEÆ.-SAPINDÉES

143° **ÆSCULUS** L. **PAVIA**. — **MARRONNIER**

- Æ. hippocastanum** L. — M. d'Inde. *Europe australe et Asie.*
var. crispa. — M. d'I. à feuilles crépues.
 — **laciniata** (*heterophylla*). — M. d'I. à feuilles laciniées.
 — **variegata**. — M. d'I. à feuilles panachées.
 — **flore pleno**. — M. d'I. à fleurs doubles.
Æ. rubicunda Lois. — M. rouge. *Patrie inconnue.*
Æ. glabra Willd. *Æ. ohioensis*. Michx. — M. glabre. *Amér. sept.*
Æ. chinensis Bunge. — M. de la Chine. *Chine bor.*
Æ. flava Ait. *Æ. neglecta* Lindl. **P. flava** DC. — M. jaune.
 Pavia à fleurs jaunes. *Amér. sept.*
var. purpuracens Gray. **P. discolor** Pursh. **P. hybrida**.
 Spach. — M. à deux couleurs (Pavia). *Amér. sept.*

- Æ. Pavia** Michx. *P. Rubra* Lmk. — **M.** Pavia. **P.** rouge. *Amér. sept.*
Æ. indica Wall. *P. indica* Camb. — **M.** de l'Himalaya. *Indes orientales.*
Æ. parviflora Walt. *Macrothyr sus discolor* Spach. — **P.** *Macrostachya* Michx. **M.** à petites fleurs. *Amér. sept.*
Æ. californica Nutt *Calothyrsus* Spach. — **M.** de Californie. *États-Unis.*

144° **UNGNADIA** Endl.

- U. speciosa** Endl. — **U.** remarquable. *Texas et Nouveau-Mexique.*

145° **KELREUTERIA** Laxm.

- K. paniculata** Laxm. — **K.** paniculé. *Chine.*

146° **XANTHOCERAS** Bnge.

- X. sorbifolia** Bnge. — **X.** à feuilles de Sorbier. *Chine sept.*

147° **SAPINDUS** Lin. — **SAVONNIER**

- S. mukorossi** Gaertn. — **S.** de Mukoros. *Japon.*
S. marginatus Willd *S. sapodaria* Lmk. — **S.** marginé. *États-Unis.*

TRIBU II. — STAPHYLEACEÆ.-STAPHYLÉACÉES

148° **STAPHYLEA** L. — **STAPHYLIER**

- S. pinnata** L. — **S.** à feuilles pennées (vulg. *faux Pistachier, nez-coupé*). *Europe australe.*
S. colchica Steud. — **S.** de la Colchide. *Asie occident.*
S. trifoliata L. — **S.** à trois feuilles. *Amér. sept.*

XXXVII. MALVACEÆ. — **MALVACÉES**

TRIBU I. — MALVEÆ.-MALVÉES

149° **HIBISCUS** L. — **KETMIE**

- H. syriacus** L. — **K.** de Syrie. *Asie occidentale.*

- var. totus albus.* — **K.** de **S.** toute blanche.
 — **albus plenus.** — **K.** de **S.** à fleurs blanches doubles.
 — **carneus plenus.** — **K.** de **S.** à fleurs carnées doubles.
 — **pœoniæflorus.** — **K.** de **S.** à fleurs de Pivoine.
 — **violaceus plenus.** — **K.** de **S.** à fleurs violettes doubles.
 — **anemonæflorus.** — **K.** de **S.** à fleurs d'Anémone.
 — **monstruosus plenus.** — **K.** de **S.** à fleurs monstrueuses doubles.
 — **foliis variegatis.** — **K.** de **S.** à feuilles panachées.

150° **PLAGIANTHUS** *Forst.* — **PLAGIANTHE**

- P. divaricatus** *Forst.* — **P.** divarique. *Nouvelle-Zélande.*

TRIBU II. — STERCULIACEÆ. - STERCULIACÉES

151° **STERCULIA** *Lin.*

- S. platanifolia** *L.* — **S.** à feuilles de Platane. *Chine.*

TRIBU III. — TILIACEÆ. - TILIACÉES

152° **TILIA** *Lin.* — **TILLEUL**

- T. sylvestris** *Desf.* **T. parvifolia** *Ehrh.* — **T.** des bois. **T.** à petites feuilles. *Europe.*
var. Parmentieri. — **T.** de Parmentier.
T. platyphylla *Scop.*, **T. Europea** *Desf.* **T. Mollis** *Spach.* — **T.** à grandes feuilles. *Europe.*
var. pyramidalis. — **T.** à **G. F.** pyramidal.
 — **laciniata.** — **T.** à **G. F.** laciniée.
 — **pendula.** — **T.** à **G. F.** pleureur.
 — **corallina.** — **T.** à **G. F.** rouge.
 — **spectabilis.** — **T.** à **G. F.** remarquable.
T. argentea *Desf.* — **T.** argenté. *Hongrie*
var. Mandshurica. — **T.** de la Mandchourie. *Asie sept.*
T. Americana *L.* **T. Canadensis** *Michx.* — **T.** d'Amérique. *Amér. sept.*
var. pubescens T. truncata Spach. — **T.** d'**A.** pubescent.
T. heterophylla *Vent.* — **T.** hétérophylle. *Asie sept.*

153° **ARISTOTELIA** *L'Hérit.*

A. Macqui *L'Hérit.* **A. glandulosa** *Ruiz.* — **A. Macqui**, *Chili.*

XXXVIII. TERNSTROËMIACEÆ. — TERNSTROËMIACÉES154° **STACHYURUS** *Sieb et Zucc.*

S. præcox *Sieb et Zucc.* — **S. précocæ**, *Japon.*

XXXIX. HYPERICINEÆ. — HYPÉRICINÉES155° **HYPERICUM** *L.* — **MILLEPERTUIS**

H. androsæmum *L.* — **M. officinal** (*Toutesaine*), *Eur. bor.*

H. calycinum *L.* — **M.** à grand calice, *Turquie.*

H. elatum *Ait.* — **M.** élevé, *Amér. boréale.*

H. hircinum *L.* — **M.** à odeur de bouc, *Europe mérid.*

var. minor. — **M.** à O. d. **B.** nain.

H. Kalmianum *L.* — **M.** de Kalm, *Amér. sept.*

H. oblongifolium *Chois.* — **M.** à feuilles oblongues, *Nép.*

XL. CISTINEÆ. — CISTINÉES156° **CISTUS** *Tourn.* — **CISTE**

C. iadaniferus *L.* — **C.** iadanifère, *Rég. médit.*

C. laurifolius *L.* — **C.** à feuilles de Laurier, *Rég. médit.*

C. incanus *L.* — **C.** blanchâtre, *Rég. médit.*

C. albidus *L.* — **C.** cotonneux, *Rég. médit.*

C. crispus *L.* — **C.** crépu, *Rég. médit.*

C. Monspeliensis *L.* — **C.** de Montpellier, *Rég. médit.*

C. hirsutus *L.* — **C.** hérissé, *Rég. médit.*

XLI. TAMARISCINEÆ. — TAMARISCINÉES157° **TAMARIX** *L.* — **TAMARISC**

T. africana *Poir.* — **T.** d'Afrique, *Rég. médit.*

T. gallica L. — T. de France. *Europe.*

T. Indica Willd. — T. des Indes. *Asie.*

458° **MYRICARIA** Desv. — **MYRICAIRE**

M. germanica Desv. — M. ou Tamarix d'Allemagne. *Europe.*

XLII. SALICINÆE. — SALICINÉES

159° **SALIX** Tourñ. — **SAULE**

S. pentandra L. — S. à cinq étamines. *Europe.*

S. Laurina Smith. — S. à feuilles de Laurier. *Europe.*

S. viminalis L. — S. viminal (Osier vert). *Europe.*

S. alba L. — S. blanc. *Europe.*

var. **argentea**. — S. B. argenté.

— **vitellina** L. — S. B. vitellin (Osier jaune). *Europe.*

S. Russelliana Forb. — S. de Russel (*S. fragile-blanc*).
Europe.

S. cinerea L. — S. cendré. S. gris. *Europe.*

S. sericea Gaud. *S. canescens* Willd. — S. de Seringe.
Europe.

S. amygdalina L. *Striandra*. — S. Amandier (Osier brun).
Europe.

S. cuspidata Schulz *S. pentandra-fragilis* Wim. — S. cus-
pide. *Europe.*

S. fragilis L. — S. fragile. *Europe.*

S. Daphnoïdes Vill. *S. glauca* Hort. — S. daphnée. *Europe.*

S. babylonica L. — S. pleureur. S. de Babylone. *Perse.*

var. **annularis**. — S. P. à feuilles annelées.

— **sieboldii** Hort. *S. elegantissimi*. C. Koch. — S. P. de
Siebold. *Japon.*

S. japonica Thbg. — S. du Japon.

S. Petzoldii Hort. — S. de Petzold. *Asie.*

S. acutifolia Hort. — S. à feuilles en coin. *Europe.*

S. rubra-purpureoides. — S. rouge purpureoïde. *Europe.*

S. incana Schrank. *S. Rosmarinifolia* Gouan. *S. elæagnos*
Scop. — S. drapé. *Europe.*

S. purpurea L. — S. pourpre (Osier rouge). *Europe.*

S. Smithana Willd. *S. Dasydotos* Wim. *S. acuminata* Sm. —
S. de Smith. *Europe.*

- S. rugosa** Hort. — **S.** rugueux. *Europe.*
S. rubra Huds. — **S.** rouge. *Europe.*
S. pontederana Scheich. — **S.** de Pontedera. *Europe.*
S. nigricans Smith. — **S.** noircissant. *Europe.*
S. grandifolia Sering. — **S.** à grandes feuilles. *Europe.*
S. aurita L. — **S.** à oreillettes. *Europe.*
S. caprœa L. — **S.** marceau. *Europe.*
var. **pendula**. — **S. M.** pleureur.

160^e **POPULUS** Tourn. — **PEUPLIER**

- P. tremula** L. — **P.** Tremble. *Europe sept.*
var. **pendula**. — **P. T.** pleureur.
P. tremuloides Michx. **P. græca** Willd. — **P.** faux Tremble.
Amér. sept.
P. bolleana (Mus-Paris). — **P.** de Boll. *Patrie?*
P. alba L. — **P.** blanc. *Ypréau.* **P. blanc de Hollande.** *Eur.*
P. canescens Smith. **P. albo-tremula** Kr. — **P. grisaille**
(Grisard). *Europe.*
P. nigra L. — **P.** noir. **P. franc.** *Europe.*
var. **pyramidalis**. — **P. N.** pyramidal. **P. d'Italie.** *Orient.*
P. canadensis Desf. (**fœmina**), **P. monilifera** Ait. — **P.** du
M. Canada. **P. suisse.** *Amér. sept.*
P. canadensis (mascula). **P. virginiana** Desf. **P. angulata**
Lois. — **P.** de Virginie. **P. régénéré.**
P. berolinensis C. Koch. — **P.** de Berlin. *Orig. hybride.*
P. balsamifera L. — **P.** Baumier. *Amér. sept.*
P. candicans Ait. **P. ontariensis** Desf. — **P.** du lac Ontario.
Amér. sept.
P. heterophylla L. **P. cordifolia** Bunge. — **P.** hétérophylle.
Amér. sept.
P. simoni Hort. — **P.** de Simon. *Chine.*

XLIII. **BALSAMIFLUEÆ.** — **BALSAMIFLUÉES**161^e **LIQUIDAMBAR** L. — **COPALME**

- L. styraciflua** L. — **L.** copal. Copalme d'Amérique. *Amér. sept.*
L. orientalis Mill. — **L.** imberbe. **C.** d'Orient. *Asie mineure.*

XLIV. SAPOTÆÆ. — SAPOTÉES

162° **BUMELIA** Swartz.

- B. lycioides** Pursh. — **B. faux** Lyciet. *États-Unis. Sud.*
B. tenax Willd. *Sideroxylon tenax* L. — **B. tenace.** *Caroline.*

XLV. GARRYACEÆ. — GARRYACÉES

163° **GARRYA** Dougl.

- G. elleptica** Dougl. — **G. elliptique.** *Californie.*
G. macrophylla Benth. — **G.** à grandes feuilles. *Mexique.*
G. Fadyeni Hook. — **G.** de Fadyen. *Amér. mérid.*
G. elliptico-Fadyeni Thur. — **G.** de Thuret. *Origine hybride.*

XLVI. BIGNONIACEÆ. — BIGNONIACÉES

164° **BIGNONIA**. Tourn.

- B. Capreolata** Ltn. — **B.** grimpant. *Caroline.*

165° **TECOMA** Juss.

- T. radicans** Juss. — **T.** radicañt, *Jasmin de Virginie. Jasmin trompette. Amér. sept.*
 var. **coccinea.** — **T. R.** à fleurs coccinées.
 — **punicea.** — **T. R.** à fleurs de Grenadier.
 — **flava.** — **T. R.** à fleurs jaunes.
 — **præcon.** — **T. R.** précoce.
T. grandiflora. — **T.** à grandes fleurs. *Japon.*
 var. **multiflora.** — **T.** à **G. F.** multiflore.

166° **CATALPA**. Scop.

- C. bignonioides** Walt. *C. vulgaris.* — **C.** commun. *États-Unis.*
 var. **aurea.** — **C. C.** doré.

- C. bungei** *C. A. Mey.* — **C.** de Bunge. *Chine.*
 var. **pumila** (*nana*). — **C.** de **B.** nain.
C. Kœmpferi *DC.* — **C.** de Kœmpfer. *Japon.*
C. speciosa *Warder.* — **C.** magnifique. *Amér. sept.*

XLVII. SCROFULARINEÆ. — PERSONNÉES

167° **PAULOWNIA** *Sieb et Zucc.*

- P. imperialis** *Sieb et Zucc.* — **P.** majestueux. *Japon.*

168° **BUDDLEÏA** *L.*

- B. curviflora** *Hook.* — **B.** à fleurs courbes. *Japon.*
B. Lindleyana *Fortune.* — **B.** de Lindley. *Chine.*
B. globosa *Lmk.* — **B.** globuleux. *Chine.*

169° **VERONICA** *L.* — **VÉRONIQUE**

- V. speciosa** *R. Cunn.* — **V.** élégante. *Nouvelle-Zélande.*
V. Traversii *Shrub.* — **V.** de Travers. *Nouvelle-Zélande.*

XLVIII. BORRAGINEÆ. — BORRAGINÉES

170° **EHRETIA** *L.*

- E. serrata** *Bn.* — **E.** à feuilles serrées. *Japon.*

XLIX. LABIATÆ. — LABIÉES

171° **LAVANDULA** *L.* — **LAVANDE**

- L. spica** *L.* — **L.** officinale (vulg. *Aspic*). *Europe.*

172° **HYSSOPUS** *L.* — **HYSSOPE**

- H. officinalis** *L.* — **H.** officinal. *Europe.*

173° **TEUCRIUM** *L.* — **GERMANDRÉ**

- T. fruticans** *L.* — **G.** arbrisseau. *Rég. médit.*

174° **ROSMARINUS L. — ROMARIN**

R. officinalis L. — **R. officinal.** *Rég. médit.*

175° **PHLOMIS L.**

P. fruticosa L. — **P. arbrisseau.** *Rég. médit.*

L. VERBENACEÆ. — VERBÉNACÉES176° **VITEX L. — GATILLIER**

V. agnus-castus L. — **G. agneau-chaste, arbre au poivre.** *Rég. médit.*

V. negundo L. V. arborea Desf. — **G. arborescent.** *Népaul.*

V. incisa Lmk. — **G. à feuilles incisées.** *Mongolie.*

177° **CALLICARPA L. — CALLICARPE**

C. americana L. — **C. d'Amérique.** *Louisiane.*

C. Japonica Thunb. — **C. du Japon.** *Japon.*

C. Sinensis Hort. — **C. de Chine.** *Chine.*

C. Murasakii Sieb. — **C. de Murasaki.** *Asie.*

C. purpurea Jus. — **C. pourpre.** *Chine et Japon.*

C. arborea Roxb. — **C. arborescent.** *Népaul.*

178° **CLERODENDRON L.**

C. foetidum Bunge, C. Bungei Steud. — **C. fétide.** *Chine.*

C. imperialis Hort. C. Serotinum (Mus. Paris). — **C. majestueux.** *Chine.*

179° **CITHAREXYLIUM L. — CITHAREXYLON**

C. ligustrinum Thur. — **C. faux Troène.** *Patrie?*

LI. SOLANEÆ. — SOLANÉES180° **LYCIUM L. — LYCIET**

L. europæum L. — **L. d'Europe.** *Europe.*

- L. sinense** *Lmk.* — **L.** de Chine. *Chine.*
L. barbarum *L.* — **L.** de Barbarie. *Orient.*
L. afrum *L.* — **L.** d'Afrique. *Afr. sept.*

181° **SOLANUM** *L.* — **MORELLE**

- S. dulcamara** *L.* — **M.** douce-amère. *Europe.*
S. glaucophyllum *Desf.* — **M.** à feuilles glauques. *Amér. austr.*
S. Jasminoïdes *Part.* — **M.** faux Jasmin. *Amér. mérid.*

182° **CESTRUM** *L.*

- C. Parqui** *L'Hérit.* — **C.** à baies noires. *Chili.*
C. elegans *Schlecht (Habrothannus Scheidw.)* — **C.** élégant.
Mexique.

183° **IOCHROMA** *Scheidw.*

- I. coccineum** *Scheidw.* — **I.** cocciné. *Amér. centrale.*

184° **FABIANA** *Ruiz et Paw.* — **FABIANE**

- F. imbricata** *Ruiz et Paw.* — **F** imbriquée. *Chili.*

LII. ASCLEPIADEÆ. — ASCLÉPIADÉES

185° **PERIPLOCA** *L.* — **PÉRIPLOQUE**

- P. græca** *L.* — **P.** de la Grèce (*bourreau des arbres*). *Europe australe.*

186° **MARSDENIA** *R. Br.*

- M. erecta** *R. Br.* — **M.** dressé. *Asie mineure.*

187° **STYRACEÆ.** — **STYRACÉES****STYRAX** *Tourn.* — **ALIBOUFIER**

- S. officinale** *L.* — **A.** officinal. *Europe australe.*

188° **PTEROSTYRAX** *Sieb et Zucc.*

- P. hispidum** *Sieb et Zucc.* — **P.** hispide. *Japon.*

189° **HALESIA** Ellis.**H. tetraptera** L. — **H.** à quatre ailes. *Caroline.***H. diptera** L. — **H.** à deux ailes. *États-Unis.***LIII. EBENACÆ. — ÉBÉNACÉES**190° **DIOSPYROS** Dalech. — **PLAQUEMINIER****D. Kaki** L. *fil.* **D. Sinensis** Thunb. — **P.** Kaki de la Chine.
*Chine.**var. costata* — **D. Si-Tche** Bnge. — **P.** Kaki du Japon.— **mazeli.** — **P. K.** de Mazel. *Japon.***D. virginiana** L. — **P.** de Virginie. *Amér. sept.**var.* — **coronaria.** — **P.** de **V.** à fruits couronnés.— — **lucida.** — **P.** de **V.** à feuilles luisantes.— — **microcarpa**, **D. pubescens**, Pursh. — **P.** de **V.**

à petit fruit.

D. lotus L. — **P.** d'Italie. *Europe australe.***LIV. OLEACEÆ. — OLÉACÉES**191° **FRAXINUS** Tourn. — **FRÈNE**

SECTION I. — A FLEURS NUES

F. excelsior L. — **F.** élevé. **F.** commun. *Europe.**var. pendula.* — **F. E.** pleureur.— **aurea.** — **F. E.** à bois doré.— **jaspidea.** — **F. E.** jaspé.— **atrovirens.** — **F. E.** vert foncé.— **laciniata.** — **F. E.** à feuilles laciniées.— **monophylla** (*heterophylla*). — **F. E.** à une feuille.— **fungosa**, **F. verrucosa** Hort. — **F. E.** verruqueux.— **nana.** — **F. E.** nain.— **angustifolia** Vahl. — **F. E.** à feuilles étroites.*Europ. austr.***F. parvifolia** Lmk. — **F. lentiscifolia** Desf. **F.** à petites feuilles.
*Région méditerranéenne.***F. oxyphylla** Bieb. **F. oxycarpa.** — **F. oxyphyllé.** *Région méditerranéenne.*

- F. Chinensis** Roxb. — F. de Chine. *Chine et Japon.*
F. alba Marsh. *F. americana* L. — F. blanc d'Amérique.
F. oregona Nutt. — F. de l'Orégon. *Amér. sept.*
F. anomala Torrey. — F. anomal. *États-Unis.*
F. quadrangulata Michx. — F. quadrangulaire. *États-Unis.*
F. platycarpa Michx. f. — F. à larges fruits. *Caroline.*
F. pubescens Walt. — F. pubescent. *Amér. sept.*
var. aucubæfolia. — F. P. à feuilles d'Aucuba.
F. juglandifolia Lmk. *F. viridis* Michx. — F. à feuilles de Noyer. *Amér. sept.*
F. sambucifolia Lmk. — F. à feuilles de Sureau. *Amér. sept.*
F. Mandshurica Regel. — F. de la Mandchourie. *Asie.*

SECTION II. — *Ornus*. Fr. à fleurs.

- F. zanthoxyloïdes** Wall. — F. faux zanthoxylum. *Orient.*
F. dimorpha Coss. et Dur. — F. dimorphe. *Algérie.*
F. Ornus L. *Ornus europæa*. Pers. — F. à fleurs. *Orient.*
var. latifolia Hort. — F. à F. à larges feuilles.
F. Bungeana Hort. — F. de Bunge. *Chine.*

192° SYRINGA L. — LILAS

- S. oblata** Fortune. — L. de la Chine.
S. vulgaris L. — L. commun. *Lilac. Europe.*
var. rosea grandiflora. — L. C. à grandes fleurs roses.
 — *rubra.* — L. C. à fleurs rouges de Trianou.
 — *gloria Rupellæ.* — L. C. gloire de Rupelle.
 — *rubra major.* — L. C. Charles X.
 — *insignis.* — L. C. remarquable.
 — *Lavalliensis.* — L. C. de Lavallée.
 — *purpurea.* — L. pourpre. L. C. de Marly.
 — *violacea.* — L. C. à fleurs violettes.
 — *cærulea.* — L. C. à fleurs bleuâtres.
 — *Philemonæ.* — L. C. de Philémon.
 — *virginalis.* — L. C. blanc.
 — *alba grandiflora.* — L. C. blanc à grandes fleurs.
S. Dubia Pers. *S. rothomagensis* Lois. — L. de Rouen. L. Variu (hybride).
var. saugeana Hort. — L. de R. sauget.

var. **sanguinea**. — L. d. R. sanguin.

— **alba**. — L. d. R. à fleurs blanches.

S. Emodi Wall. — L. de l'Himalaya. *Asie*.

S. villosa Bretsch. — L. à fleurs velues. *Asie*.

S. verrucosa Bretsch. — L. verruqueux. *Asie*.

S. Josikea Jacq. — L. de la comtesse Josika. *Hongrie*.

S. Persica L. — L. de Perse. Jasmin de Perse. *Perse*.

var. **laciniata** Schmitt. — L. d. P. à feuilles laciniées.

193° **LIGUSTRUM** Tourn. — **TROËNE**

L. sinense Hort. *L. Stauntoni* DC. — T. de Chine.

L. ibota Sieb. — T. Ibota. *Chine*.

L. lucidum Ait. *S. robustum* Hort. — T. luisant. *Chine*.

var. **variegata**. — T. L. à feuilles panachées.

L. ovalifolium Hassk. — T. à feuilles ovales.

L. japonicum Thunb. — T. du Japon. *Japon*.

var. **coriacea**. — T. d. J. à feuilles coriaces.

L. compactum Hook. *L. Laurifolium* Hort. — T. compacte.
Népaul.

L. salicifolium Decne. — T. à feuilles de Saule. *Orient?*

L. insulense Decne. — T. insulaire. *Patrie inconnue*.

L. massalongianum Visian. — T. à longues feuilles.
Orient.

L. quihoui Carr. — T. de Quihou. *Chine*.

L. vulgare Lin. — T. commun. *Europe*.

var. **variegata**. — T. C. à feuilles panachées.

— **viridis** *L. microphylla*. — T. C. à feuilles vertes.

— **fructu luteo**. — T. C. à fruit jaune.

194° **LIGUSTRINA** Rupr.

L. amurense Reg. — L. du fleuve Amour.

L. Pekinensis Bretsch. — L. de Pékin. *Chine boréale*.

195° **PHILLYREA** Tourn. — **PHILARIA**

P. angustifolia Lin. — P. à feuilles étroites. *Rég. médit.*

var. **rosmarinifolia** Hort. Kew. — P. à feuilles de Romarin.

P. media Lin. — P. intermédiaire. *Rég. médit.*

- P. latifolia** *Lin.* — **P.** à larges feuilles. *Rég. médit.*
var. buxifolia. — **P.** à **L. F.** à feuilles de Buis.
 — **ilicifolia.** — **P.** à **L. F.** à feuilles de Houx.
 — **rotundifolia.** — **P.** à **L. F.** à feuilles rondes.
P. laurifolia *Hort. P. Vilmoriniana Boiss.* — **P.** à feuilles de Laurier. *Orient.*

196° **OLEA** *Tourn.* — **OLIVIER**

- O. Europæa** *L.* — **O.** d'Europe. *Rég. médit.*
O. myrtifolia *L.* — **O.** à feuilles de Myrte. *Rég. médit.*
O. americana *L.* — **O.** d'Amérique. *Amér. sept.*

197° **OSMANTHUS** *Lour.* — **OSMANTHE**

- O. fragrans** *Lour. Olea fragrans Thunbg.* — **O.** odorant *Japon.*
O. ilicifolius *Hort.* — **O.** à feuilles de Houx. *Japon.*
var. foliis variegatis. — **O.** d. **H.** à feuilles panachées.
O. latifolius *Hort.* — **O.** à grandes feuilles. *Japon.*

198° **CHIONANTHUS** *L.* — **CHONANTHE**

- C. virginica** *L.* — **C.** de Virginie. *Amér. sept.*

199° **FONTANESIA** *Labill.*

- F. phillyræoides** *Labill.* — **F.** faux Philaria. *Syrie.*
var. Fortunei Carr. — **F.** f. **P.** de Fortune. *Chine.*

200° **FORSYTHIA** *Vahl.*

- F. suspensa** *Vahl.* — **F.** élevé. *Japon et Chine.*
var. Fortunei Lindl. — **F.** **E.** de Fortune. *Chine boréale.*
F. viridissima *Lindl.* — **F.** très vert. *Chine.*

TRIBU JASMINEÆ. - JASMINÉES

201° **JASMINUM** *Tourn.* — **JASMIN**

- J. officinale** *L.* — **J.** officinal. **J.** commun. *Rég. médit.*
J. fruticans *L.* — **J.** frutescent. **J.** jaune. *Rég. médit.*
J. humile *L.* — **J.** nain. *Rég. médit.*

- J. nudiflorum** L. — **J. nudiflore.** *Chine.*
J. affine Royle. — **J. effilé.** *Indes orientales.*
J. revolutum Sims. — **J. revoluté.** *Népaul.*

202° **FORESTIERA** Poir.

- F. ligustrina** Poir. — **F. faux Troène.** *Amér. sept. j*

LV. VACCINIEÆ. — VACCINIÉES

203° **VACCINIUM** L. — AIRELLE

- V. myrtillus** L. — **A. myrtille** (vulg. *Raisin des bois*). *Europe.*
V. uliginosum L. — **A. uligineuse.** *Europe.*
V. vitis-idea. — **A. Canche.** *Europe.*
V. pensylvanicum Link. — **A. de Pensylvanie.** *Amér. Nord.*

204° **OXYCOCCOS** Tourn. — CANNEBERGE

- O. vulgaris** Pers. — **C. commune.** *Europe.*

LVI. ÉRICACEÆ. — ERICACÉES

205° **ERICA** L. — BRUYÈRE

- E. vulgaris** L. *Calluna vulgaris* Salisb. — **B. commune.** *Europe.*
E. cinerea L. — **B. cendrée.** *France.*
E. tetralix L. — **B. quaternée.** **B. des marais.** *France.*
E. multiflora L. — **B. multiflore.** *Europe.*
E. vagans L. — **B. vagabonde.** *France.*
E. scoparia L. — **B. à balais.** *France.*
E. arborea L. — **B. en arbre.** *Rég. médit.*

206° **ARBUTUS** Tourn. — ARBOUSIER

- A. unedo** L. — **A. commun.** **Arbre à fraises.** *France.*
var. salicifolia. — **A. C. à feuilles de Saule.**
 — **quercifolia.** — **A. C. à feuilles sinuées.**

var. **rubra**. — **A. C.** à fleurs rouges.

— **flore pleno**. — **A. C.** à fleurs doubles.

A. andrachne L. — **A.** andrachné. *Orient.*

207° **ARCTOSTAPLYLLOS** Adans. — **BUSSEROLE**

A. uva-ursi Spreng. — **B.** raisin d'ours. *Europe.*

208° **PERNETTYA** Gaud.

P. mucronata Gaudich. — **P.** à feuilles mucronées. *Magellan.*

209° **CLETHRA** Gærtn.

C. alnifolia L. — **C.** à feuilles d'Aune. *Virginie.*

C. tomentosa Lamk. — **C.** tomenteux. *Virginie.*

C. paniculata Ait. — **C.** paniculé. *Caroline.*

C. acuminata Michx. — **C.** acuminé. *Caroline.*

210° **GAULTHERIA** Kalm.

G. procumbens L. — **G.** couché. *Amér. sept.*

211° **ZENOBIA** D. Don.

Z. speciosa D. Don. *Andromeda pulverulenta* Lois. — **Z.** élégant. *Virginie.*

Z. floribunda DC. — **Z.** à fleurs nombreuses. *Caroline.*

212° **ANDROMEDA** L. — **ANDROMÈDE**

A. polifolia L. — **A.** à feuilles de Polium. *Europe.*

A. calyculata L. (*Cassandra* D. Don.). — **A.** calyculé. *Eur. bor.*

A. angustifolia Pursh. (*Cassandra* Don.). — **A.** à feuilles aiguës. *Caroline.*

A. tetragona L. (*Cassiope* D. Don.). — **A.** tétragone. *Eur. bor.*

A. ligustrina Mühl. (*Lyonia* Nutt.). — **A.** troène. *Amér. sept.*

A. frondosa Pursh (*Lyonia* Nutt.). — **A.** touffu. *Virginie.*

A. arborea L. *oxydendron arboreum* DC. — **A.** arborescent. *Floride.*

A. axillaris Ait. (*Leucothoe* Don.). — **A.** axillaire. *Maryland.*

A. formosa Wall. (*Pierris* Don.). — **A.** élégant. *Népaul.*

A. japonica Thunb (*Pierris* Don.). — **A.** du Japon.

A. Rolissoni Hort. (*Pierris* Hort.). — **A.** de Rolisson. Hort.

213° **DABŒCIA** D. Don.

D. polifolia D. Don. *Menziesia polifolia* Juss. — **D.** à feuilles de Polium. *Pyrénées occidentales.*

214° **MENZIESIA** Smith.

M. globularis Salisb. *M. ferruginea* Bot. Mag. — **M.** à fleurs globuleuses. *Virginie.*

215° **LEDUM** L.

L. buxifolium Berg. (*Leiophyllum* Pers). — **L.** à feuilles de Buis. *États-Unis.*

L. palustre L. — **L.** des marais. *Europe boréale.*

L. latifolium Ait. — **L.** à larges feuilles. *Amér. sept.*

216° **KALMIA** L.

K. angustifolium L. — **K.** à feuilles étroites. *Canada.*

Variétés horticoles diverses.

K. latifolia L. — **K.** à larges feuilles. *Amér. sept.*

Variétés horticoles diverses.

K. glauca Ait. — **K.** glauque. *Amér. sept.*

Variétés horticoles diverses.

217° **AZALEA** Desv. — **AZALÉE**

ESPÈCES AMÉRICAINES

A. viscosa L. — **A.** visqueux. *États-Unis.*

var. ornata. — **A. V.** élégant. *Origine hybride.*

A. glauca Lmk. — **A.** glauque. *Amér. boréale.*

Variétés horticoles diverses.

A. nudiflora L. — **A.** nudiflore. *Amér. sept.*

Variétés horticoles diverses.

A. calendulacea Michx. — **A.** souci. *Virginie.*

Variétés horticoles diverses.

ESPÈCES ASIATIQUES

A. pontica L. — **A.** d'Orient. *Asie mineure.*

Variétés horticoles diverses.

A. amœna Hook. — **A.** gracieuse. *Chine.*

A. sinensis Lodd. **A. mollis** Blum. — **A.** de la Chine.

Variétés horticoles diverses.

218° RHODODENDRON L. — ROSAGE

ESPÈCES D'EUROPE, D'AMÉRIQUE ET DE SIBÉRIE

R. ponticum L. — **R.** pontique. **R.** commun. *Asie mineure.*

R. myrtifolium Lodd. — **R.** à feuilles de Myrthe. *Géorgie.*

R. azaloïdes Desf. — **R.** Azalée. *Origine hybride.*

R. maximum L. — **R.** d'Amérique. *États-Unis.*

R. catawbiense Michx. — **R.** de Catawba. *Caroline.*

Variétés horticoles diverses.

R. chrysanthum L. — **R.** à fleurs jaunes. *Sibérie.*

R. caucasicum Pall. — **R.** du Caucase.

R. altaclarensis Lindl. — **R.** à fleurs en bouquet. *Am. sept.*

R. ferrugineum L. — **R.** ferrugineux. *Europe.*

R. hirsutum L. — **R.** hérissé. *Europe.*

R. Dahuricum L. — **R.** de Dahourie. *Sibérie.*

var. sempervirens. — **R.** d. **D.** toujours vert.

ESPÈCES ASIATIQUES

R. arboreum Smith. — **R.** en arbre. *Népal.*

Variétés horticoles diverses.

R. Campbellii. — **R.** de Campbell. *Himalaya.*

LVII. COMPOSITÆ. — COMPOSÉES

219° ARTEMISIA L. — ARMOISE

A. arborescens L. — **A.** arborescente. *Orient.*

220° OLEARIA Mœnch. — ASTER

O. Haastii Hook. *Eurybia parvifolia* Hort. — A. de Haast.
Nouvelle-Zélande

221° BACCHARIS L.

B. halimifolia L. — B. à feuilles d'Halime (*Senecyon en arbre*). Amér. sept.

222° DIPLOPAPPUS Less.

D. chrysophyllus Less. — D. à feuilles dorées. Nouvelle-Zélande.

LVIII. ELÆAGNEÆ. — ÉLÉAGNÉES

223° HIPPOPHAE L. — ARGOUSIER

H. rhamnoides L. — A. faux Nerprun (*Saule épineux*). Europe.
var. **angustifolia** Lodd. — A. à feuilles étroites. Sibérie.

H. saliciolia Don. — A. à feuilles de Saule. Népaül.

224° SHEPHERDIA Nutt.

S. Canadensis Nutt (*Hippophaë* L.). — S. du Canada. Am. sept.

S. argentea Nutt (*Hippophaë* Pursh). — S. argenté. Am. sept.

225° ELÆAGNUS L. — CHALEF

E. argentea Pursh. — C. argenté. Amér. sept.

E. angustifolia L. *E. Hortensis* Bieb. — C. à feuilles étroites
(*Olivier de Bohême*). Orient.

var. **orientalis**. — C. A. d'Orient.

E. edulis Hort. *E. longipes* Asa-Gray. — C. à fruits doux.
Japon.

E. reflexa Decne. — C. réfléchi. Japon.

var. **Simoni** Carr. — C. R. de Simon. Chine.

— **foliis variegatis**. — C. R. à feuilles panachées.

E. macrophylla Thunb. — C. à grandes feuilles. Japon.

LIX. THYMELEÆ. — THYMÉLÉES

226° DAPHNÉ Lin.

D. lauréola L. — D. lauréole. Europe.

D. encorum L. — **D.** camelée (Petit thymèle). *Europe.*

Variétés horticoles diverses.

D. striata Tratt. — **D.** strié. *Europe.*

D. oleoides Schreb. — **D.** oléoïde. *Europe.*

D. alpina L. — **D.** des Alpes. *Europe.*

D. mezereum L. — **D.** bois gentil. **D.** garou. *Europe.*

var. **Van-Houttei**. — **D. B. G.** à feuilles pourpre noir. *Hort.*

227° **DIRCA** Lin.

D. palustris L. — **D.** des marais (*Bois cuir*). *Amér. sept.*

LX. NYSSACEÆ. — NYSSACÉES

228° **NYSSA** Lin. — **TUPELO**

N. aquatica Michx. — **T.** aquatique. *Amér. sept.*

N. sylvatica Michx. **N.** *multiflora* Wang. — **T.** des forêts.
Amér. sept.

LXI. LAURINEÆ. — LAURINÉES

229° **LAURUS** Tourn. — **LAURIER**

L. nobilis L. — **L.** noble. **L.** d'Apollon. **L.** sauce. *Bég. médit.*
var. **angustifolia**. — **L. N.** à feuilles étroites.

— **crispa**. — **L. N.** à feuilles crispées.

L. glauca Thurb (*Litsæa* Sieb.). — **L.** glauque. *Japon.*

230° **SASSAFRAS** Nees.

S. officinale Nees *Laurus sassafras*. L. — **S.** officinal. *États-Unis.*

LXII. MYRICACEÆ. — MYRICACÉES

231° **MYRICA** Lin.

M. gale L. — **M.** galé (*Bois sent bon*). *Europe.*

M. cerifera L. — **M.** cirier (*Arbre à la cire*). *Louisiane.*

LXIII. BETULACEÆ — BÉTULACÉES

232° **BETULA** Tourn. — **BOULEAU**

B. alba L. *B. verrucosa* Ehrh. — **B. blanc**, **B. verruqueux**.
Europe.

var. foliis purpureis. — **B. B.** à feuilles pourpres.

— **fastigiata.** — **B. B.** pyramidal.

— **pendula.** — **B. B.** pleureur. *Europe et Sibérie.*

— **laciniata.** — **B. B.** à feuilles laciniées. *Hort.*

— **nana.** — **B. B.** nain.

B. populifolia. — **B.** à feuilles de Peuplier. *Amér. sept.*

B. papyrifera Michx. *B. amygdalifolia* Hort. — **B.** à papier.
Amér. sept.

B. pubescens Ehrh. — **B.** pubescent. *Europe.*

B. urticifolia Reg. — **B.** à feuilles d'Ortie. *Suisse.*

B. Bhojpaltra Wall. *B. utilis* Don. — **B.** utile. *Japon.*

B. lutea Michx f. *B. excelsa* Pursh. — **B.** jaune. *Amér. sept.*

B. nigra L. *B. rubra* Michx f. — **B.** noir. **B.** rouge. *Amér. sept.*

B. pumila L. *B. rotundifolia* Hort. — **B.** chétif. *Amér. boréale.*

B. nana L. — **B.** nain. *Europe boréale.*

B. lenta Willd. — **B.** Merisier. *Amér. boréale.*

B. acuminata L. *B. cylindrostachya* Wall. — **B.** acuminé.
Népal.

233° **ALNUS** Tourn. — **AUNE**

A. viridis DC. *Alnaster viridis* Spach. — **A.** vert jaunâtre.
Europe.

A. glutinosa Willd. — **A.** glutineux. *Europe et Asie.*

var. laciniata A. imperialis. — **A. G.** à feuilles laciniées.

— **quercifolia** Willd. — **A. G.** à feuilles de Chêne.

— **pubescens** Reg. — **A. G.** pubescent.

A. serrulata Willd. — **A.** serrulé. *Amér. sept.*

A. incana Willd. — **A.** blanchâtre. *Europe.*

var. laciniata. — **A. B.** à feuilles laciniées.

A. japonica S. et Z. — **A.** du Japon. *Mandchourie et Japon.*

A. orientalis Decne. *A. subcordata* C. A. Mey. — **A.** d'Orient.

A. cordifolia Ten. — **A.** à feuilles en cœur. *Europe mérid.*

LXIV. CUPULIFERÆ. — CUPULIFÈRES

TRIBU I. — CORYLÆÆ. — CORYLÉES

234° **CORYLUS** *Tourn.* — NOISETIER, COUDRIER

- C. avellana** *L.* — **N.** avelinier, Coudrier. *Europe.*
var. heterophylla *Fish.* — **N. A.** hétérophylle. *Daourie.*
 — **laciniata** (*urticæfolia*) — **N. A.** à feuilles laciniées.
 — **pendula.** — **N. A.** pleureur.
 — **macrocarpa.** — **N. A.** à gros fruits.
 — **racemosa.** — **N. A.** à grappes.
 — **striata.** — **N. A.** à fruits striés.
C. tubulosa. — **N.** tubulé. **N. franc.** *Istrie.*
var. purpurea. — **N. T.** pourpre.
 — **fragilis.** — **N. T.** à coque tendre.
 — **fructu albo.** — **N. T.** à fruit blanc.
 — **fructu rubro.** — **N. T.** à fruit rouge.
C. Americana *Walt.* — **N.** d'Amérique. *Amér. sept.*
C. rostrata *Ait.* — **N.** à fruits rostrés. *Amér. sept.*
C. columna *L. C. byzantina* *Clus.* — **N.** de Turquie. *Europe. australe.*

235° **OSTRYOPSIS** *Decne.*

- O. Davidiana** *Decne.* — **O.** de David. *Mongolie.*

236° **CARPINUS** *Tourn.* — CHARME

- C. betulus** *L.* — **C.** commun, charmillé. *Europe et Asie.*
var. fastigiata. — **C. C.** pyramidal.
 — **pendula.** — **C. C.** pleureur.
 — **incisa.** — **C. C.** à feuilles incisées.
 — **quercifolia.** — **C. C.** à feuilles de Chêne.
 — **purpurea.** — **C. C.** pourpre.
C. Caroliniana *Walt. C. americana* *Lmk.* — **C.** de la Caroline. *Amér. sept.*
C. Orientalis *Lmk. C. Duinensis* *Scop.* — **C.** d'Orient. *Asie occidentale.*
C. virginiana *Mill. Ostrya Virginica* *Willd.* — **C.** de Virginie. *Amér. sept.*

237° **OSTRYA** *Micheli*.

O. Carpinifolia Scop. — O. à feuilles de Charme. *Europe mérid. et Asie.*

TRIBU II. — QUERCINEÆ.-QUERCINÉES

238° **FAGUS** *Tourn.* — **HÊTRE**

- F. sylvatica** L. — H. commun (*Foutiau, Fayard*). *Europe.*
var. purpurea. — H. C. à feuilles pourpres.
 — — **pendula.** — H. C. P. pleureur.
 — **pendula.** — H. C. pleureur.
 — **retroflexa.** — H. C. réfléchi. H. nain.
 — **tortuosa.** — H. C. Tortillard.
 — **pyramidata.** — H. C. pyramidal. H. parasol.
 — **laciniata** (*asplenifolia*). — H. C. à feuilles laciniées.
 — **cristata.** — H. C. à feuilles crispées.
 — **foliis variegatis.** — H. C. à feuilles panachées.
 — **quercoides.** — H. C. à feuilles de Chêne.
F. ferruginea Ait. — H. ferrugineux. H. d'Amérique.

239° **CASTANEA** *Tourn.* — **CHATAIGNIER**

- C. vulgaris** Lmk. C. *Vesca* *Gærtn.* — C. commun. *Europe.*
var. Americana. — C. C. d'Amérique. *États-Unis.*
 — **heterophylla.** — C. C. hétérophylle.
 — **macrocarpa.** — C. C. à gros fruits (*Marrons*).
C. pumila Mill. — C. C. nain (*Chinquapin*). *États-Unis.*

240° **CASTANOPIS** *Spach.*

C. chrysophylla A. DC. — C. à feuilles jaunes. *Orégon.*

241° **QUERCUS** L. — **CHÈNE**

ESPÈCES D'EUROPE, DU NORD DE L'AFRIQUE ET DE L'ORIENT

- Q. pedunculata** Willd. — C. pédonculé. *Europe.*
var. fastigiata. — C. P. pyramidal. *Europe.*
 — **laciniata** (*Fennesii*). — C. P. à feuilles laciniées.
 — **pendula.** — C. P. pleureur.

- var. **purpurea**. — **C. P.** à feuilles pourpres.
 — **microcarpa**. — **C. P.** à petits fruits.
 — **macrocarpa** (*Thomasii* Ten). — **C. P.** à gros fruits.
Calabre.
 — **Haas Kotchy**. — **C. P.** de Haas. *Asie mineure.*
- Q. Apennina** Lmk. — **C.** des Apennins. *Europe.*
- Q. robur** Mill. *Q. Sessiliflora* Smith. — **C.** rouvre. *Europe.*
 var. **latifolia typica**. — **C. R.** à larges feuilles (type).
 — **Afghanistanensis** Booth. — **C. R.** de l'Afghanistan.
Orient.
 — **Louetti Hort.** — **C. R.** de Louet. **C. R.** hétérophylle.
- Q. pubescens** Willd. *Q. Sessiliflora*, var. *pubescens* Loud. —
C. pubescent. **P.** blanc. *Europe.*
- var. **glomerata** Lmk. — **C. P.** à trochets, à fruits agglomérés.
 — **lanuginosa** DC. — **C. P.** laineux.
 — **laciniata** Lmk. — **C. P.** à feuilles laciniées.
 — **purpurea**. — **C. P.** pourpre.
 — **ambigua** DC. — **C. P.** ambigu. *Italie.*
 — **Ajudaghiensis** Ster. — **C. P.** de Russie.
- Q. Tozza** Bosc. *Q. Stolonifera* Lapeyr. — **C.** Tauzin. *Eur. occid.*
- Q. conferta** Kit. — **C.** à fruits serrés. *Sud-est de l'Europe.*
- Q. macranthera** Fisch et May. — **C.** à grandes fleurs. *Caucase.*
- Q. Daimio** Sieb. *Q. Dentata* Thumb. — **C.** du Japon.
- Q. Mirbeckii** Dur. *Q. lusitanica* var. *Batica* Webb. — **C.** de Mirbeck. **C.** Zan. *Afrique sept.*
- Q. Lusitanica** Lmk. — **C.** du Portugal. *Sud-Ouest Europe.*
- Q. Orientalis.** A. DC. *Infectoria* Oliv. — **C.** à Galles. *Asie mineure.*
- Q. humilis** Lmk. — **C.** nain. *Portugal.*
- Q. cerris** L. *Q. Crinita* Desf. — **C.** chevelu. **C.** crinité. *Europe mérid.*
 var. **austriaca** Willd. — **C. C.** d'Autriche.
 — **Fulhamensis** Loud. — **C. C.** de Fulham. *Hort. brit.*
 — **laciniata** Loud. — **C. C.** à feuilles laciniées.
- Q. castanefolia** C. A. Mey. — **C.** à feuilles de Châtaignier. *Sud-Est Europe et nord Afrique.*
- Q. Libani** Kotschy. — **C.** du Liban. *Asie mineure.*
- Q. macrolepis** Kotschy. — **C.** à grosses écailles. *Crète.*

- Q. Ægilops** L. *Q. Vallonea* Kotschy. — **C.** Ægilops. **C.** Vélani. *Europe orientale.*
- Q. pseudo-suber** Santi. *Q. Fontanesii* Guss. — **C.** faux Liège. *Sud-Ouest. Europe et Afrique.*
- Q. occidentalis** Gay. — **C.** d'Occident. Corcier des Landes. *Europe occid.*
- Q. suber**. L. — **C.** (Liège Surier). *Rég. médit.*
- Q. Ilex** L. — **C.** vert. **C.** yeuse. *Europe mérid.*
var. agrifolia. — **C.** V. à petites feuilles.
 — **latifolia.** — **C.** V. à grandes feuilles.
 — **Fordii.** — **C.** V. de Fordi. **C.** vert pyramidal. *Hort.*
 — **Ballota** Desf. — **C.** V. à glands doux. *Afrique sept.*
- Q. coccifera** L. *Q. Kermesiana* Hort. — **C.** Kermès. *Rég. médit.*
- Q. serrata** Thunb. *Q. bombyx glabra.* — **C.** denté serré. *Japon.*
- Q. tomentosa** Hort. — **C.** bombyx tomenteux. *Japon.*
- Q. glauca** Thunb. — **C.** glauque. *Japon.*

ESPÈCES DU NORD DE L'AMÉRIQUE

- Q. alba** L. — **C.** blanc (*White oak*).
- Q. macrocarpa** Michx. — **C.** à gros fruit (*Burr oak*).
- Q. lyrata** Walt. — **C.** à feuilles lyrées (*over. cup oak*).
- Q. prinus** L. *Q. montana* Willd. — **C.** Prin (*Chestnut oak*).
- Q. virens** Ait. — **C.** vert d'Amérique (*Live oak*).
- Q. rubra** L. — **C.** rouge (*Red oak*).
- Q. coccinea** Wang. — **C.** écarlate (*Scablet oak*).
- Q. tinctoria** Bartr. — **C.** quercitron (*Black oak*).
- Q. nigra** L. — **C.** noir (*Jack oak*).
- Q. falcata** Michx. — **C.** à feuilles en faux (*Spanish oak*).
- Q. Catesbæi** Michx. — **C.** de Catesby (*Turkey oak*).
- Q. palustris** Du Roi. — **C.** des marais (*Pin oak*).
- Q. cinerea** Michx. — **C.** cendré (*Upland Willow oak*).
- Q. imbricaria** Michx. — **C.** à lattes (*Laurel oak*).
- Q. Phellos** L. — **C.** à feuilles de Saule (*Willow oak*).
- Q. bainsteri** Michx. — **C.** de Banister (*Bear's oak*).

ESPÈCES DU SUD DES ÉTATS-UNIS ET DU MEXIQUE

- Q. reticulata** H. B. K. *Q. rugosa* Nees. — **C.** réticulé. **C.** rugueux.

- Q. xalapensis** H. B. K. — C. de Xalapa.
Q. laurifolia Hort. — C. à feuilles de Laurier. Floride.

LXV. JUGLANDEÆ. — JUGLANDÉES

242° JUGLANS Lin. — NOYER

- J. regia** Lin. — N. royal. N. commun. Europe et Asie.
 var. **laciniata** (*heterophylla*). — N. C. à feuilles laciniées.
 — **fragilis** (*tenera*). — N. C. à coque tendre. N. mésange.
 — **fertilis** *J. præparturiens*. — N. C. fertile.
 — **macrocarpa**. — N. C. à gros fruits (*Noix bijoux*).
 — **serotina**. — N. C. (tartif. N. de la Saint-Jean).
 — **Bartheriana**. — N. C. de Barthère. N. à noix allongées.
 — **microcarpa**. — N. C. à petits fruits.
 — **Vilmoriniana**. — N. de Vilmorin. Orig. hybride?
J. kamaonia DC. *Prodr.* — N. de Kamaon. Asie sept.
J. hybrida Hort. — N. hybride. Hort.
J. ailantifolia Sieb. — N. à feuilles d'Ailante. Asie sept.
J. Sieboldii Maxim. — N. de Siebold. Asie sept.
J. rupestris Engel. — N. des rochers. Amér. sept.
J. nigra L. — N. noir. Amér. sept.
J. cinerea L. *J. cathartica* Michx. — N. cendré. Amér. sept.

243° CARYA Nutt.

- C. sulcata** Nutt. — N. sillonné. États-Unis.
C. olivæformis Nutt. — N. pacanier. Louisiane.
C. amara Nutt. — N. amer. Géorgie et Texas.
C. porcina Nutt. — N. des porcs. États-Unis.
C. tomentosa Nutt. — N. cotonneux. États-Unis.
C. alba Nutt. — N. à noix blanche. États-Unis.
C. myristicæformis Nutt. — N. muscade. Caroline et Géorgie.
C. aquatica Nutt. — N. aquatique. Caroline.

244° PTEROCARYA Kunth.

- P. caucasica** C. A. Mey. — P. du Caucase.
P. fraxinifolia spach. — P. à feuilles de Frêne. Russie.

P. stenoptera DC. *P. Sinensis Hort.* — **P.** à feuilles ailées.
Asie sept.

P. Dumosa Lavall. — **P.** en buisson. *Origine inconnue.*

245° **PLATYCARYA** Sieb et Zucc.

P. strobilacea Sieb et Zuc. — **P.** à strobiles. *Japon.*

LXVI. ULMACEÆ. — ULMACÉES

TRIBU I. — ULMACEÆ. - ULMACÉES

246° **ULMUS** Tourn. — **ORME**

U. campestris L. — **O.** champêtre. *Europe.*

var. **suberosa.** — **O. C.** subereux.

— **foliis purpureis.** — **O. C.** à feuilles pourpres.

— **fastigiata.** — **O. C.** pyramidal.

— **nana.** — **O. C.** nain.

— **microphylla.** — **O. C.** à petites feuilles.

— **carpinifolia.** — **O. C.** à feuilles de Charme.

— **incisa.** — **O. C.** à feuilles incisées.

— — **aurea.** — **O. C.** à feuilles dorées.

— **Dauvessi.** — **O. C.** de Dauvesse.

— **tortuosa.** — **O. C.** tortillard.

— **horizontalis.** — **O. C.** étalé.

U. montana Wit. — **O.** des montagnes. *Europe.*

var. **pendula.** — **O. d. M.** pleureur.

— **stricta.** — **O. d. M.** dressé (*O. d'Oxford*).

— **hollandica.** — **O. d. M.** de Hollande. **O.** à larges
feuilles.

— **triserrata.** — **O. d. M.** triserré.

— **fastigiata.** — **O. d. M.** pyramidal.

— **cinerea.** — **O. d. M.** cendré.

— **monstruosa.** — **O. d. M.** monstrueux.

U. effusa Willd. — **O.** diffus. **O.** pédonculé. **O.** blanc. *Europe.*

U. americana Willd. — **O.** d'Amérique. *États-Unis.*

U. fulva Michx. — **O.** fauve. *États-Unis.*

U. alata Michx. f. — **O.** ailé. *États-Unis.*

U. racemosa Thomas. — **O.** à grappes. *États-Unis.*

- U. parvifolia** Jacq. *U. chinensis* Desf. — **O.** à petites feuilles. Chine.
U. Sibirica Hort. *U. parv. decidua*. — **O.** de Sibérie. Asie sept.

247° **PLANERA** Gmelin.

- P. crenata** Desf. (*Zelkova* Spach). — **P.** crénelé. Caucase.
 var. **repens**. — **P. C.** étalé.
P. aquatica Gmelin. — **P.** aquatique. États-Unis.
P. acuminata Planch. — **P.** Japonica. **P.** à feuilles acuminées. Japon.

TRIBU II. — CELTIDÆ.- CELTIDÉES

248° **CELTIS** Tourn. — **MICOCOULIER**

- C. australis** L. — **M.** de Provence. Rég. médit.
C. occidentalis L. — **M.** de Virginie. États-Unis.
 var. **crassifolia** Lmk. — **M.** d. V. à feuilles épaisses. Am. sept.
 — **Audibertiana** Spach. — **M.** d. V. d'Audibert. Amér. sept.
C. Tournefortii Lmk. *C. aspera* Hort. — **M.** d'Orient. Rég. médit.
C. sinensis Willd. — **M.** de Chine. Asie orientale.
C. Davidiana Decne. — **M.** de David. Asie orientale.

LXVII. ARTOCARPEÆ. — ARTOCARPÉES

TRIBU I. — FICACEÆ.- FICACÉES

249° **FICUS** Tourn. — **FIGUIER**

- F. carica** L. — **F.** commun. Rég. médit.
 Variétés horticoles diverses.
F. elastica Roxburg. — **F.** élastique. Indes.
F. macrophylla Desf. — **F.** à grandes feuilles. Nouvelle-Hollande.

TRIBU II. — MOREÆ.- MORÉES

250° **MORUS** Tourn. — **MURIER**

- M. alba** L. — **M.** blanc. Chine.
 var. **multicaulis** Loud. — **M. B.** multicaule. **M.** des Philippines. Chine.

- var. **pyramidalis** Ser. — **M. B.** pyramidal.
 — **laciniata**. — **M. urticæfolia**. **M. B.** à feuilles laciniées.
 — **nervosa** Hort. — **M.** nerveux.
 — **Constantinopolitana**. — **M. B.** de Constantinople.
 — **macrophylla** Lodd, *M. Moretti* Ser. — **M. B.** à grandes feuilles.
 — **Tokwa** Boreau, *M. Japonica* Hort. — **M. B.** du Japon.
M. rubra L. *M. Canadensis* Link. — **M.** rouge. *Amér. sept.*
 var. **macrophylla**. — **M. R.** à grandes feuilles.
M. nigra L. — **M.** noir. *Asie mineure.*

251° **BROUSSONETIA** Vent.

- B. papyrifera** Vent. (*Morus* L.) — **B.** à papier (*Mûrier*).
Chine et Japon.
 var. **cucullata** Hort. — **B.** à P. à feuilles cucullées.
 — **macrophylla** (*integrifolia*). — **B.** à P. à grandes feuilles.
 — **nana** Bur. — **B.** à P. nain.
 — **laciniata**. — **B.** à P. à feuilles laciniées.
B. Kœmpferi Sieb. — **B.** de Kœmpfer. *Japon.*

252° **MACLURA** Nutt.

- M. aurantiaca** Nutt. — **M.** à bois jaune (*Oranger des Osages*).
Louisiane.
 var. **calcar-galli** Hort. — **M.** ergot de coq.

253° **CUDRANIA** Trécul (*Cudrania Rumph.*)

- C. tricuspidata** Bur. — **C.** à feuilles tricuspidées. *Chine.*

LXVIII. POLYGONACEÆ. — POLYGONACÉES

254° **POLYGONUM** L. — **RENOUÉE**

- P. chinense** L. (*Ampeligonum* Lindl). — **R.** de la Chine.

255° **BRUNNICHIA** Banks.

- B. cirrhosa** Banks. — **B.** cirrheux. *Caroline.*

256° **MUHLENBECKIA**

- M. complexa** Meisn. — **M.** embrassant. *Nouvelle-Zélande.*

257° **ATRAPHAXIS** L.

A. spinosa L. — **A.** épineux. *Asie occid.*

LXIX. CHENOPODEÆ. — CHÉNOPODÉES258° **ATRIPLEX** L. — **ARROCHE**

A. Halimus L. — **A.** Halime (*Pourpier de mer*). *Europe.*

LXX. CASUARINEÆ. — CASUARINÉES259° **CASUARINA** Rumph. — **FILAO**

C. equisetiformis Fost. — **F.** à forme de prêle. *Afrique orientale.*

C. tenuissima Hort. — **F.** très ténu. *Australie.*

DIVISION II

DICOTYLÉDONÉES GYMNOSPERMES

(*Bois résineux.*)

LXXI. CONIFERÆ. — CONIFÈRESTRIBU I. — **ABIETINEÆ. — ABIÉTINÉES**260° **ABIES** Lmk. — **SAPIN**

A. pectinata DC. — **S.** pectiné. **S.** argenté. *Europe.*

A. Nordmanniana Spach. — **S.** de Nordmann. *Caucase.*

A. Cephalonica Lmk. — **S.** de Céphalonie. *Orient.*

A. Cilicica Kotschy. — **S.** de Cilicie. *Taurus.*

A. balsamea Mill. — **S.** baumier. *Baumier du Canada.*

A. Fraseri Lindl. — **S.** de Fraser. *Caroline.*

var. Hudsonica (*prostrata*). — **S.** de **F.** d'Hudson.

- A. concolor** Lindl. — **S.** concolore. *Colorado.*
A. lasiocarpa Nutt. — **S.** à fruits velus. *Californie.*
A. nobilis Lindl. — **S.** noble. *Californie et Océan.*
A. pichta Fisch. *A. Sibirica* Ledeb. — **S.** à la poix. *Sibérie.*
A. firma S. et Z. — **S.** robuste. *Japon.*
A. bracteata H. et Arn. — **S.** à bractées. *Californie.*
A. spectabilis Spach. *A. Webbiana* Lindl. — **S.** remarquable. *Himalaya.*
A. bifida S. et Zuc. — **S.** bifide. *Japon.*
A. religiosa Lindl. — **S.** sacré. *Mezique.*
A. amabilis Forbes. — **S.** gracieux. *Amér. boréale.*
A. Gordoniana Carr. *A. grandis* Lindl. — **S.** de Gordon. *Californie.*
A. Pindrow Spach. — **S.** Pindrow. *Himalaya.*
A. Tschonoskiana Regel. — **S.** de Tschonoski. *Hort. Pétersbourg.*
A. numidica de Lannoy. — **S.** de Numidie. *Afrique sept.*
A. Pinsapo Boiss. — **S.** pinsapo. *Espagne. Kabylie.*

261° **KETELEERIA** Carr.

- K. fortunei** Carn. *Abies Jezoensis* Lindl. — **K.** de Fortune. *Chine.*

262° **PSEUDOTSUGA** Carr.

- P. Douglasii** Carr. — **P.** de Douglas. *Californie.*
 var. **glauca**. — **P.** d. D. glauque.

263° **TSUGA** Carr.

- T. canadensis** Carr. *Abies Canadensis* Michx. — **T.** du Canada. *Amér. boréale.*
 var. **Sieboldii** Carr. — **T.** de Siebold. *Japon.*
T. Mertensiana Lindl. — **T.** de Mertens. *Océan.*
T. Hookeriana Carr. *Abies Williamsonii*. — **T.** de Hooker. *Californie.*

264° **PICEA** Link. — **EPICEA, PESSE**

- P. polita** Carr. *A. polita* S. et Z. — **E.** élégant. *Japon.*
P. excelsa Link. — **E.** commun. **E.** élevé. *Europe.*
 var. **nana**. — **E. C.** nain.
 — **Grignonensis**. — **E. C.** de Grignon.

- var. pyramidata.* — **E. C.** pyramidal.
P. alba Link. — **E.** blanc, Sapinette blanche. *Amér. sept.*
var. cœrulea. — **E.** Sapinette bleue. *Amér. sept.*
P. nigra Link. — **E.** noir. *Amér. boréale.*
var. rubra. — **E. N.** rouge. *Amér. boréale.*
 — **Doumetii.** — **E. N.** de Doumet.
P. orientalis Carr. — **E.** d'Orient. *Asie mineure.*
P. morinda Link. — **E.** à longues feuilles. *Himalaya.*
P. Menziesii Carr. — **E.** de Menzies. *Amér. sept.*
P. alcockiana Carr. — **E.** d'Alcock. *Japon.*
P. Engelmanni Engelm. — **E.** d'Engelmann. *Amér. sept.*
P. pungens Engel. *P. Paryana* Andr. — **E.** piquant. *Amér. sept.*
var. glauca. — **E. P.** glauque.

265° **LARIX** Link. — **MÉLÈZE**

- L. Europæa** DC. — Méléze d'Europe. *Europe.*
var. pendula. — **M. d'E.** pleureur.
 — **Dahurica.** — **M. d'E.** de Dahourie. *Asie.*
L. japonica Carr. — **M.** du Japon. *Japon.*
L. microcarpa Forb. *L. americana* Michx. — **M.** à petits fruits. *Amér. sept.*
L. Griffithiana Hooker. — **M.** de Griffith. *Himalaya.*
L. Kœmpferi Fort. *Pseudo-Larix* Gord. — **M.** de Kœmpfer. *Chine.*

266° **CEDRUS.** — **CÈDRE**

- C. Libani** Barr. — **C.** du Liban. *Asie mineure.*
var. stricta. — **C. d. L.** pyramidal.
C. Atlantica Manet. — **C.** de l'Atlas. **C. argenté.** *Atlas.*
var. glauca. — **C. d. l'A.** glauque.
C. Deodora Loud. *C. indica* de Chamb. — **C. Deodora.** *Himalaya.*
var. viridis. — **C. D.** à feuilles vertes.

267° **PINUS** Lin. — **PIN**

PINS A DEUX FEUILLES

- P. pinea** L. — **P.** pignon. **P.** d'Italie. **P.** parasol. *Rég. médit.*
var. fragilis. — **P. P.** à coque tendre.

- P. Fremontiana** Endl. *P. monophylla* Torr. — **P.** de Frémont. *Californie.*
- P. pinaster** Sol. *P. maritima* Lamb. — **P.** maritime. *Région méditerranéenne.*
- P. Massoniana** S. et Z. — **P.** de Masson. *Japon.*
- P. pungens** Michx. — **P.** piquant. *Amér. sept.*
- P. densiflora** S. et Z. — **P.** densiflore. *Japon.*
- P. Loiseleuriana** Carr. — **P.** de Loiseleur. *Orig. ?*
- P. Laricio** var. *Corsica* Hort. — **P.** Laricio var. de Corse. *Région méditerranéenne.*
- **Pallasiana** Loud, *P. taurica* Hort. — **P. L.** de la Tauride.
- **Austriaca** Loud, *P. nigra* Link. — **P. L.** d'Autriche. *Carinthie.*
- **Monspeliensis** Saltzm. *P. Saltzmani* Duval. — **P.** de Montpellier. *Cévennes.*
- **calabrica** Hort. — **P. L.** de Calabre.
- **Brutia** Tenor. — **P. L.** des Abruzes. *Calabre.*
- **pyrenaica** Loud. — **P.** des Pyrénées.
- P. rubra** Spach, *P. canadensis.* — **P.** rouge. *Amér. boréale.*
- P. Halepensis** Ait. — **P.** d'Alep. **P.** de Jérusalem. *Région méditerranéenne.*
- var. **rotunda** Hort. — **P.** d'A. boule.
- P. inops** Soland. — **P.** pauvre. **P.** chétif. *Amér. sept.*
- P. montana** Mill. — **P.** de montagne. *Europe.*
- var. **pumilio** Hænke. — **P.** chétif. *Alpes.*
- **uncinata** Ramond. — **P.** à crochets. *Alpes.*
- **Mughus** Scop. — **P.** Mugho. *Europe.*
- P. sylvestris** L. *P. rubra* Mill. — **P.** sylvestre. **P.** d'Écosse. *Europe.*
- var. **Haguencensis.** — **P.** S. de Hagueneau. *Alsace.*
- **Rigensis.** — **P.** S. de Riga. *Russie.*
- **fastigiata.** — **P.** S. pyramidal.
- **nana.** — **P.** S. nain.
- P. Banksiana** Lamb. — **P.** de Banks. *Nouvelle-Écosse.*
- P. mitis** Michx (*Yellow pine*). — **P.** doux. **P.** jaune. *Amér. sept.*
- P. contorta** Douglas. *P. Boursieri* Carr. — **P.** entortillé. *Amér. sept.*

PINS A TROIS FEUILLES

- P. longifolia** Roxb. — P. à longues feuilles. *Népal*.
P. canariensis Smith. — P. des Canaries. *Ténériffe*.
P. Gerardiana Wallich. — P. de Gérard. *Himalaya*.
P. taeda Lin. — P. à l'encens. *Floride*.
P. Benthamiana Hartw. — P. de Bentham. *Californie*.
P. Sabiniana Dougl. — P. de Sabine. *Amér. sept.*
P. Coulteri Dougl. — P. de Coulter. *Californie*.
P. insignis Dougl. — P. remarquable. *Californie*.
P. Jeffreyi Balfour. — P. de Jeffrey. *Californie*.
P. tuberculata Gord. — P. tuberculeux. *États-Unis*.
P. muricata D. Don. — P. des rats. *Californie*.
P. ponderosa Dougl. *P. Deflexa* Torr. — P. pesant. *Amér. sept.*
P. Parryana Gord. — P. de Parry. *Haute-Californie*.
P. rigida Mill. — P. rigide (*Pitch pine*). *Amér. boréale*.
P. scrotina Michx. — P. tardif. *Caroline*.
P. patula Schiede et Depp. — P. étalé. *Mexique*.
P. Bungeana Zucc. — P. de Bunge. *Chine sept.*
P. Australis Michx. *P. palustris* Mill. — P. austral. *Virginie*.
P. Engelmanni Carr. — P. d'Engelmann. *Nouv.-Mexique*.

PINS A CINQ FEUILLES

- P. Cembra** L. — P. Cembro. *Alpes, Sibérie*.
P. monticola Douglas. — P. des montagnes. *Californie*.
P. strobus Lin. — P. du Lord Weymouth. *États-Unis*.
var. nana. — P. d. L. nain.
 — *umbraculifera*. — P. d. L. parasol.
P. excelsa Wallich. — P. élevé. *Himalaya*.
P. Lambertiana Dougl. — P. de Lambert. *Californie*.
P. parviflora Sieb. et Zuc. — P. à petites fleurs. *Japon*.
P. Mandshurica Rupr. — P. de la Mandchourie.
P. Koraiensis Sieb. et Zuc. — P. de Corée. *Japon*.
P. aristata Engelm. — P. arisé. *États-Unis*.
P. Moctezumæ Lamb. — P. de Moctezuma. *Mexique*.
P. flexilis James. — P. flexible. *États-Unis*.
P. ayacahuite Ehr. — P. ayacahuité. *Mexique*.

SOUS-TRIBU. — ARAUCARIEÆ

268° **ARAUCARIA** *Jussieu.*

A. imbricata *Pav.* [*colymbea imbricata* *Carr.* — **A. imbriqué.**
Chili.

269° **SCIADOPITYS** *Sieb. et Zucc.*

S. verticillata *S. et Z.* — **S. verticillé.** *Japon.*

270° **CUNNINGHAMIA** *Rob. Brow.*

C. sinensis *R. Br.* — **C. de la Chine.**

271° **SEQUOIA** *Endl.*

S. sempervirens *Endl.* — **S. toujours vert.** *Californie.*

S. gigantea *Endl* (*Wellingtonia* *Lindl.*). — **S. géant.** *Californie.*

var. **pendula.** — **S. G.** à rameaux retombants.

272° **TAXODIUM** *Rich.*

T. distichum *Rich.* — **T. distique** (Cyprès chauve). **C. de la**
Louisiane. États-Unis.

var. **fastigiata.** — **T. D. fastigié.**

— **pendula.** *T. sinense* *Forb.* — **T. D. pleureur.** **T. de**
Chine. Chine.

T. mexicanum *Carr.* *T. mucronatum* *Ten.* — **T. du Mexique.**
T. mucroné. *Mexique.*

273° **CRYPTOMERIA** *Don.*

C. Japonica *Don.* — **C. du Japon.**

var. **compacta,** *C. J. araucarioides* *Hort.* — **C. du J.**
compacte.

— **nana.** — **C. du J. nain.**

C. elegans *Veitch.* — **C. élégant.** *Japon.*

TRIBU II. — CUPRESSINEÆ. - CUPRESSINÉES

274° **CUPRESSUS** *Tourn.* — **CYPRÈS**

C. horizontalis *Mill.* — **C. horizontal.** *Europe et Asie.*

- C. fastigiata** DC. — **C.** pyramidal. Europe et Asie.
C. torulosa Don. — **C.** toruleux. Népaül.
C. Lusitanica Mill. — **C.** du Portugal. Indes (Goa).
 var. **Lindleyi** Carr. — **C.** d. P. de Lindley. Mexique.
C. Knighthiana Hort. — **C.** de Knighth. Mexique.
C. excelsa Scott. — **C.** élevé. Guatemala.
C. funebris Endl. — **C.** funèbre. Chine.
C. californica Carr. — **C.** de Californie. **C.** aromatique.
 Californie.
C. Mac-Nabiana Murr. — **C.** glanduleux. Californie.
C. Lambertiana Carr. **C. macrocarpa** Hort. — **C.** de Lambert. Californie.
C. Hartwegii Carr. — **C.** de Hartweg. Californie.
C. Goweniana Gordon. — **C.** de Gowen. Californie.

275° CHAMECYPARIS Spach.

- C. Boursieri** Decne. *Cupr. Lawsonniana* Murr. — **C.** de Boursier. Californie.
 var. **nana**. — **C.** d. B. nain.
 — **aurea**. — **C.** d. B. doré.
C. Noutkaensis Sp. *Tuopsis borealis* Fisch. — **C.** de Noutka. Amér. boréale.
C. sphæroïdea Sp. *Cupressus Thuyoides* Lin. — **C.** sphéroïdal. Amér. sept.
C. obtusa Sieb. et Zucc. — **C.** obtus. Japon.
 var. **lycopodioides**. — **C.** faux lycopode. Japon.
 — **pygmæa**. — **C. F. L.** pygmée.
 — **plumosa**. — **C. F. L.** plumeux.
C. pisifera Sieb. et Zucc. — **C.** porte-pois. Japon.
 var. **variegata**. — **C. P.** panaché.
C. leptoclada Henk (*Retinospora* Zucc). — **C.** leptoclada. Japon.
C. ericoides Carr. *R. squarrosa* Sieb. et Zucc. — **C.** à forme de bruyère. Japon.
 var. **decussata** Hort. *R. Junperoides* Carr. — **C.** décussé. Japon?

276° THUOPSIS Sieb. et Zucc.

- T. dolabrata** Sieb. et Zucc. — **T.** en doloire. Japon.

- var. **variegata**. — **T.** en **D.** panaché.
 — **nana**. — **T.** en **D.** nain.
 — **laete virens** Lindl. — **T.** en **D.** blanc verdâtre. *Chine.*

277° **BIOTA** Don.

- B. orientalis** Endlicher *Thuia* Lin. — **B.** d'Orient. *Asie sept.*
 var. **nana**. — **B.** d'O. nain.
 — **aurea** Carr. — **B.** d'O. doré.
 — **Tartarica** Endl. — **B.** d'O. de Tartarie.
 — **dumosa**. — **B.** d'O. buisson.
 — **monstruosa**. — **B.** d'O. monstrueux.
 — **glauca**. — **B.** d'O. glauque.
 — **variegata**. — **B.** d'O. panaché.
 — **filiformis**. — **B.** d'O. filiforme.
 — **pendula**. — **B.** d'O. pleureur.
 — **intermedia**. — **B.** d'O. intermédiaire.
 — **Meldensis**. — **B.** d'O. de Meaux.

278° **THUIA** Linné.

- T. occidentalis** Lin. — **T.** d'Occident. *Amér. boréale.*
 var. **nana**. — **T.** d'O. nain.
 — **variegata**. — **T.** d'O. panaché.
 — **Wareana** Both. *T. plicata* Don. — **T.** plié.
 — **Sibirica** Hort. *T. robusta* Carr. — **T.** de Sibérie.
 — **Menziesii** Dougl. *T. lobbii* Hort. *T. gigantea* Hook. —
T. de Menzies. *Californie.*

279° **LIBOCEDRUS** Endl. — **LIBOCÈDRE**

- L. decurrens** Torr. *Thuia gigantea* Nutt. — **L.** décurrent.
Amér. boréale.
L. Chiliensis Endl. — **L.** du Chili. *Chili austral.*

280° **CALLITRIS** Vent.

- C. quadrivalvis** Vent. — **C.** à quatre valves (*Thuja articulé*). *Afrique sept.*

281° **FITZ-ROYA** Hooker f.

- F. patagonica** Hooker f. — **F.** de Patagonie.

282° JUNIPERUS L. — GENÉVRIER

- J. macrocarpa** *Sibthorpe*. — G. à gros fruits. *Rég. médit.*
J. drupacea *Labill.* — G. à drupes. *Asie*.
J. cedrus *Webb*. — G. cèdre. *Ténériffe*.
J. oxycedrus *Lin.* — G. oxycèdre (*G. cadier*). *Rég. méditer.*
J. communis *Lin.* — G. commun. *Europe*.
var. stricta *J. hibernica* *Lodd.* — G. C. pyramidal.
J. reflexa *Hort.* *J. oblonga* *Bieb.* — G. réfléchi. *Europe sept.*
et Tauride.
J. nana *Willd.* — G. nain. *Régions boréales*.
J. Jacobi *Hort.* — G. de Jacob. *Orig. ?*
J. Japonica *Carr.* — G. du Japon. *Chine et Japon*.
J. rigida *Sieb. et Zucc.* — G. rigide. *Japon*.
J. recurva *Hamilt.* *J. repanda* *Hort.* — G. recourbé. *Népal*.
J. squammata *Den.* *J. procumbens* *Sieb.* — G. rampant.
Népal.
J. Chinensis *L. masc.* — G. de Chine indiv. mâle. *Chine et Japon*.
 — **fœmin.** — G. de C. femelle.
J. tetragona *Schlec.* — G. tétragone. *Mexique*.
J. phœnicea *Lin.* — G. de Phénicie. *Rég. médit.*
J. Virginiana *Lin.* — G. de Virginie (*Cèdre de Virginie*).
Amér. sept.
var. cinerascens. — G. d. V. cendré.
 — *pendula.* — G. d. V. pleureur.
 — *glaucæ.* — G. d. V. glauque.
 — *pyramidalis.* — G. d. V. pyramidal.
 — *variegata.* — G. d. V. panaché.
J. dealbata *Loudl.* — G. blanchâtre. *Amér. sept.*
J. excelsa *Willd.* — G. élevé. *Asie mineure*.
var. pyramidalis. — G. E. pyramidal.
J. religiosa *Royle.* — G. sacré. *Himalaya*.
J. mexicana *Schlec.* — G. du Mexique.
J. flacida *Schlec.* — G. flacide. *Mexique*.
J. sabinæ *Lin.* — G. sabine. *Europe mérid.*
var. repens. — G. S. rampante.
J. thurifera *Lin.* — G. odorant. *Europe austr.*

TRIBU III. — TAXINÉE Tournef. - TAXINÉES

283° PRUMNOPYTIS Philippi.

P. elegans Philippi. — P. élégant. Chili.

284° TAXUS Tourn. — IF

- T. baccata** Lin. — I. commun. Europe.
 var. **adpressa** Carr. — I. C. déprimé.
 — **stricta vel erecta**. — I. C. dressé.
 — **fastigiata**. — I. C. fastigié.
 — — **variegata**. — I. C. fastigié panaché.
 — **microphylla**. — I. C. à petites feuilles.
 — **aurea** — I. C. doré.
 — **argentea**. — I. C. argenté.
 — **glauca**. — I. C. glauque.
 — **Dovastonii** Carr. — I. C. de Dovaston.
 — **Cheshuntensis** Gord. — I. C. de Cheshunt.
 — **Jacksonii** Gord. — I. C. de Jackson.
 — **nana**. — I. C. nain.
 — **canadensis**. — I. C. du Canada.
 — — **variegata**. — I. d. C. panaché.
 — **Boursieri**. — I. C. de Boursier. Amér.

285° TORREYA Arnott.

- T. nucifera** Sieb. et Z. *Podocarpus Coreana* Hort. — T. nucifère. Japon.
T. taxifolia Arnott. — T. à feuilles d'If. Floride.
T. myristica Hooker f. — T. muscadier. T. de Californie.
T. grandis Fortune. — T. élevé. Chine.

286° CEPHALOTAXUS S. et Z. — CEPHALOTAXE

- C. pedunculata** S. et Z. — C. pédonculé. Japon.
C. Fortunei Hook. — C. de Fortune. Chine sept.
C. drupacea S. et Z. — C. drupacé. Chine et Japon.

287° GINKGO Kempfer. *Salisburia* Smith.

- G. biloba** Lin. *S. adiantifolia* Smith. — G. à deux lobes
 (Arbre aux quarante écus). Japon.

- var. **variegata**. — G. B. panaché.
 — **laciniata**. — G. B. à feuilles laciniées.

TRIBU IV. — GNETACEÆ - GNÉTACÉES

288° **EPHEDRA** Tourn.

- E. vulgaris** Rich. *E. distachya* L. — E. commun (*Uvette*,
raisin de mer). Rég. médit.

MONOCOTYLEDONEÆ

LXXII. ASPARAGINEÆ. — ASPARAGINEES

289° **SMILAX** Tourn.

- S. aspera** Lin. — S. rude (*Salsepareille d'Europe*). Région
méditerranéenne.
S. mauritania Poir. — S. du Maroc. Rég. médit.
S. excelsa L. — S. élevé. *Caucase* et *Orient*.
S. lanccolata L. — S. lancéolé. *Amér. sept.*

290° **RUSCUS** Lin. — **FRAGON**

- R. aculeatus** Lin. — F. épineux (*Petit Houx*). *Europe*.
R. hypophyllum L. — F. hypophylle (*Laurier alexandrin*).
Italie.
R. hypoglossum L. — F. à languette. *Europe mérid.*
R. racemosus Lin. *Danae racemosa* Murch. Rég. médit.

LXXIII. LILIACEÆ. — LILIACÉES

291° **YUCCA** Lin.

- Y. gloriosa** L. — Y. glorieux. *Amér. sept.*
 var. **longifolia**. — Y. G. à longues feuilles.
 — **glaucescens**. — Y. G. glauque.
 — **pendula**. — Y. G. retombant.
Y. flexilis Carr. — Y. flexible. *Amér. sept.*
Y. angustifolia Parsh. — Y. à feuilles aiguës. *Amér. sept.*

LXXIV. GRAMINEÆ. — GRAMINÉES

292° ARUNDO Lin. — DONAX

A. donax L. — D. à quenouilles, Canne de Provence. *Rég. médit.*

293° BAMBUSA Schreber. — BAMBOU

B. metake Sieb. (*Arundinaria Japonica* S et Z). — B. du Japon.

B. falcata Hort. (*Arundinaria Nees*). — B. en faux. *Népaül.*

B. Simoni Carr. (*Arundinaria Munro*). — B. de Simon. *Chine.*

B. gracilis Hort. — B. grêle. *Chine.*

B. nigra Lodd (*Phyllostachys Munro*). — B. noir. *Japon.*

B. flexuosa Hort. (*Phyllostachys Munro*). — B. flexueux. *Chine.*

B. mitis Poiret (*Phyllostachys Munro*). — B. tendre. *Chine.*

B. aurea Sieb. (*Phyllostachys Munro*). — B. doré. *Chine.*

B. viridi-glaucescens Carr. (*Phyllostachys*). — B. vert glauque. *Chine.*

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	5
Énumération des espèces	9

Table alphabétique des Familles et des Genres (1)

A			
ABELIA	43	<i>Ampelgoum</i>	82
ABIES	83	Amygdalæ	19
Abietinæ	83	<i>Amygdalopsis</i>	21
Abricotier	20	AMYGDALUS	19
Acacia	36	ANAGYRIS	31
<i>Id. faux</i>	33	ANDROMEDA	69
ACER	53	<i>Androsæmum</i>	57
Acerinæ	53	Anis étoilé	11
ACTINIDIA	13	ANONA (voir Asimina)	11
ADENOCARPUS	33	Anonacæ	11
<i>Egle</i>	15	ANTHYLLIS	32
ÆSCULUS	54	ARALIA	34
ALANTUS	15	Araliacæ	44
Airelle	68	Araucariæ	88
Ajonc	31	ARAUCARIA	88
AKEBIA	12	Arbousier	68
Alisier	26	Arbre de Judée	35
<i>Aluaster</i>	74	ARBUTUS	68
ALNUS	74	ARCTOSTAPHYLOS	69
Amandier	19	<i>Aria</i>	26
AMELANCHIER	26	Argousier	72
AMORPHA	35	ARGYROLOBIUM	32
Ampelidæ	50	ARISTOLOCHIA	37
AMPELOPSIS	52	Aristotelia	57
		Aristolochiæ	37
		ARMENIACA	20

(1) Les noms génériques adoptés sont en PETITES MAJUSCULES ; les noms synonymes, en caractères *italiques* ; les noms vulgaires ou français, en « caractères romains ordinaires » ; et les noms de familles, en **ca** **tères noirs**.

<i>Aronia</i>	27
ARTEMISIA	71
Artocarpeæ	81
<i>Arundinaria</i>	94
ARUNDO	94
Asclepiadææ	63
ASIMINA	11
Asparagineæ	93
ASTER	72
<i>Atragène</i>	10
ATRAPHAXIS	83
ATRIPLEX	83
Aubépine	24
AUCUBA	41
AUNE	74
Aurantiacææ	15
Avelinier	75
AZALEA	70
AZARA	14

B

BACCHARIS	70
Badiane	11
Baguenaudier	34
Balsamifluææ	59
Bambou	94
BAMBUSA	94
Beaumier de Giléad	84
BENTHAMIA	41
<i>Benzoin</i> (voir <i>Laurus</i>)	71
Berberidææ	11
BERBERIDOPSIS	12
BERBERIS	11
BERCHEMIA	45
Bergamottier	15
BETULA	71
Betulacææ	74
Bibacier	29
Bigaradier	15
Bigarreautier	22
BIGNONIA	60
Bignoniacææ	60
BIOTA	39
BIXACÆÆ	14
Bois d'Arc (voir <i>Maclura</i>)	82
Bois de Sainte-Lucie	22
Borragineææ	61
Boule de neige	44
Bouleau	74
Bourreau des arbres	63
Bourgène	46
BROUSSONETIA	82
Brugnonier	20
BRUNNICHIA	82
Bruyère	67

Buddleia	61
Bugrane	33
Buis	48
Buisson ardent	23
BUMELIA	60
BUPLEURUM	45
Busserole	69
Buxacææ	48
BUXUS	48

C

CALLICARPA	62
CALITRIS	90
<i>Calluna</i>	68
CALOPHACA	33
Calycanthææ	14
CALYCANTHUS	14
CALYCOTOME	32
Canneberge	68
Canne de Provence	94
Caprifoliacææ	41
<i>Caprifolium</i>	41
CARAGANA	34
<i>Cardiandra</i> (voir <i>Ehretia</i>)	61
Caroubier	35
CARPINUS	75
CARYA	79
<i>Cassandra</i>	68
<i>Cassiope</i>	68
Cassis	38
CASTANEA	76
CATANOPSIS	76
CASUARINA	83
Casuarineææ	83
CATALPA	60
CEANOOTHUS	46
CÉDRATIER	15
Cèdre	85
CEDELEA	16
CEDRUS	85
Celastrineææ	47
CELASTRUS	47
Celtidææ	81
Celtis	81
Cembro	81
CEPHALANTHUS	44
CEPHALOTAXUS	92
CERASUS	22
CERATONIA	35
CERCIS	35
Cerisier	22
Cesalpinicææ	35
CESTRUM	63
CHENOMELIS	29
Chalef	72

<i>Chamaecerasus</i>	42
CHAMÆCYPARIS	89
Charme	75
Châtaignier	76
Chêne	76
Chenopodées	83
Chèvrefeuille	41
Chicot	36
CHIMONANTHUS	14
CHIONANTHUS	67
CISSUS	52
Cistineæ	57
Ciste	57
CISTUS	57
CITHAREXYLUM	62
Citronnier	15
CITRUS	15
<i>Cladastris</i> (voir <i>Virgilia</i>)	34
Clavalier	14
CLEMATIS	9
CLERODENDRON	62
CLETHRA	69
CNEORUM	15
COCCULUS	13
Cognassier	30
COLLETIA	47
COLUTEA	34
<i>Colymbea</i>	88
Compositæ	71
Coniferae	83
Eopalme	59
<i>Corchorus</i>	19
CORIARIA	16
Coriariées	16
Cormier	26
Cornées	40
Cornouillier	40
CORNUS	40
CORONILLA	34
Corroyère	16
Corylaceæ	75
CORYLOPSIS	39
CORYLUS	75
COTONEASTER	23
Coudrier	75
CRATÆGUS	24
CRYPTOMERIA	88
CUDRANIA	82
CUNNINGHAMIA	88
Cupressinæ	88
CUPRESSUS	88
Cupulifères	75
CYDONIA	30
Cyprés	88
Cyprés chauve	88
CYTISUS	32

D

DABECIA	70
<i>Danaë</i>	93
DAPHNE	72
DESMODIUM	35
DEUTZIA	40
<i>Dierveilla</i>	43
Dilleniaceæ	13
<i>Dimorphanthus</i>	44
DIOSPYROS	64
DIPLOPAPPUS	72
DIRCA	73
Donax	94
Dryadées	17
DRYMIS	11

E

Ebenaceæ	64
Ebénier (faux)	64
EDWARDSIA	34
EBRÉTIA	61
Elæagneæ	72
ELÆAGNUS	72
EPHEDRA	93
Epicea	84
Epine noire	21
Epine-vinette	11
Erable	53
ERICA	68
Ericaceæ	68
ERIOBOTRYA	29
ESCALLONIA	39
EUCALYPTUS	16
EUPTHELA	40
EURYBIA	70
EVONYMUS	47
EXOCHORDA	19

F

FABIANA	63
<i>Fagara</i>	15
FAGUS	76
Févier	35
Ficaceæ	81
Figuier	81
FICUS	81
Filao	83
FITZ-ROYA	90
FONTANESIA	67
FORESTIERA	68
FOBSYTHIA	67
FOTHERGILLA	39
Fragon	93

Fraxinus	64
Frêne	64

G

Gainier	35
GARRYA	60
Garryacæe	60
GAULTHERIA	69
Genêt	32
Genévrier	90
GENISTA	32
GINKO	92
GLEDITSCHIA	35
Glycine	35
Gnetacæe	93
Graminæe	94
Grenadier	16
Griottier	22
Grisard	59
Groseillier	37
Guignier	22
GYMNOCLADUS	36

H

HALIMDENDRON	34
Hamamelidæe	39
HAMAMELIS	39
HALESIA	64
HEDERA	45
<i>Heteromeles</i>	27
Hêtre	76
HIBISCUS	55
HIPPOPHAE	72
HOLLBOELLIA	13
Hortensia	39
Houx	49
Houx (petit)	93
HOVENIA	47
HYDRANGEA	39
Hypericinæe	57
HYPERICUM	57
Hyssopus	61

I

IDESIA	14
If	91
ILEX	49
Ilicinæe	49
ILLICUM	11
INDIGOFERA	35
IOCHROMA	63
Indigotier	35
ITEA	39

J

Jasminæe	67
JASMINUM	67
Jasmin	67
Jonc-Marin (voir Ajonc)	31
Juglandæe	79
JUGLANS	79
Jujubier	45
<i>Julibrissin</i>	36
JUNIPERUS	90

K

KADSURA	13
Kalmia	70
KERRIA	19
<i>Keteleeria</i>	74
Ketmie	55
KOELAEUTERIA	55

L

Labiatae	61
LABURNUM	33
LAGERSTREMIA	37
LARDIZABALA	13
Lardizabaleæe	12
LARIX	85
Laurier	73
Laurinæe	73
LAURUS	73
LAVANDULA	61
LEDUM	70
<i>Leiophyllum</i>	70
Leguminosæe	81
LESPEDEZA	35
<i>Leucothoë</i>	69
LEYCESTERIA	43
LIBOCEDRUS	90
LIGUSTRINA	66
LIGUSTRUM	66
Lilas	65
Lilac	65
Liliacæe	93
Limonier	15
LIQUIDAMBAR	59
LIRIODENDRON	11
LIRIOPSIS	10
LONICERA	41
Loniceræe	41
Lyciet	62
LYCIUM	62
<i>Lyonia</i>	69
Lithraricæe	37

M

MAAKIA	34
MACLURA	82
Macqui	57
MAGNOLIA	10
Magnoliaceæ	10
MAHONIA	12
MALUS	27
Malvaceæ	55
Margousier	16
Marronnier	54
MARSDENIA	63
Mélèze	85
MELIA	16
Meliaceæ	16
MENZIESIA	70
Menispermaceæ	13
MENISPERMUM	13
Merisier	22
MESPIUS	24
Micocoulier	81
Mimoseæ	36
Millepertuis	57
Moreæ	81
Morus	81
MUHLENBECKIA	82
Mûrier	81
MYRICA	73
Myricaceæ	73
MYRICARIA	58
Myrtaceæ	16
Myrthe	16
Myrtille	68
MYRTUS	16

N

NANDINA	11
Néflier	24
Negundo	54
Nerprun	46
NESSEA	37
Noisetier	75
Noyer	79
NUTTALLIA	19
NYSSA	73
Nyssaceæ	73

O

OLEA	67
Oleaceæ	64
OLEARIA	72
Olivier	67
ONONIS	33

Oranger	15
Oranger des osages	82
Orme	80
Orme de Samarie	15
<i>Ornus</i>	65
Osiers	58
OSMANTHUS	67
OSTRYA	76
OSTRYOPSIS	75
OXYCOCCOS	68
<i>Oxydendron</i>	68

P

Pacanier	79
<i>Padus</i>	22
PAEONIA	10
PALICURUS	45
<i>Panax</i>	44
Papilionaceæ	31
PARROTTIA	39
PARTHENOCISSUS	52
PASSIFLORA	37
Passifloreæ	37
PAULOWNIA	61
<i>Pavia</i>	54
Pêcher	20
PERILOCA	63
PERNETTYA	69
PERSICA	20
Peuplier	59
PHELLODENDRON	15
Philadelphææ	40
PHILADELPHUS	41
PHILARIA	66
PHILLYREA	66
PHLOMIS	62
PHOTINIA	27
<i>Phyllostachys</i>	94
PICEA	84
<i>Pieris</i>	68
Pin	85
PINUS	85
PIRUS	29
Pistachier	36
PISTACIA	36
Pivoine	10
PLAGIANTHUS	56
PLANERA	81
Plaqueminier	64
PLATANUS	39
PLATYCARIA	80
<i>Polocarpus</i>	92
Poirier	29
Polygonaceæ	82
POLYGONUM	82

Pomaceæ	23
Pommier	27
POPULUS	59
POTENTILLA	17
<i>Pourthiea</i>	27
PRINOS	50
Prunellier	21
Prunier	20
PRUMNOPYTES	92
PRUNUS	20
<i>Pseudolarix</i>	85
PSEUDOTSUGA	84
PTELEA	15
PTEROCARYA	79
PTEROSTYRAX	63
PUNICA	16
<i>Pyracantha</i>	23

Q

Quercineæ	76
QUERCUS	76

R

Ranunculaceæ	9
RAPHIOLEPIS	27
Redoul	16
<i>Retinospora</i>	89
Rhamnaceæ	45
RHAMNUS	46
RHODODENDRON	70
RHODOTYPUS	19
RHUS	36
RIBES	37
ROBINIA	33
Robinier	33
<i>Robsonia</i>	37
Ronce	17
ROSA	30
Rosage	71
Rosaceæ	17
Roseæ	30
Rosier	30
ROSMARINUS	62
Rubiaceæ	44
RUBUS	17
RUSCUS	93

S

Sabine	91
Salicineæ	58
<i>Salisburia</i>	92
SALIX	58

Salsepareille	93
Sambucæ	43
SAMBUCUS	43
Sapin	83
Sapindaceæ	54
SAPINDUS	55
Sapinette	85
Sapoteæ	60
SARCOCOCCA	49
<i>Sarothamnus</i>	32
SASSAFRAS	73
Saule	58
Savonnier	55
Saxifragaceæ	37
SCHIZANDRA	13
Schizandraceæ	13
SCIADOPITYS	88
Scrophularineæ	61
Senecion en arbre	72
SEQUIA	88
Seringat	40
SEPPHERDIA	70
<i>Sideroxylon</i>	60
SMYLAX	93
Solanææ	62
SOLANUM	63
SOPHORA	34
Sorbier	26
SORBUS	26
Spartier	32
Spartium	32
Spiraceæ	17
SPIREA	17
STACHYRUS	57
STAPHILEA	55
Staphyleaceæ	55
STAUNTONIA	13
STERCULIA	56
Sterculiaceæ	56
STRANSVOESIA	27
Styraceæ	63
STYRAX	63
Sumac	36
Sureau	43
Sycamore	53
SYMPHORICARPOS	43
Symphorine	43
SYRINGA	65

T

Tamariscineæ	57
TAMARIX	57
Taxineæ	91
TAXODIUM	88
TAXUS	91